

Otrivin

s **novou** technologií
pumpičky:

NOSNÍ ~~SPREJ~~ MLHA


HALEON

Nabídněte svým pacientům **úlevu** **od ucpaného nosu**



Ergonomický design
„jeden stisk, jedna
dávka“

Tlačítko na boční
straně ovládané
palcem



Nový revoluční design*
– **lepší pokrytí:**
vytváří **jemnou mlhu**,
která rovnoměrně
pokryje sliznici nosní
dutiny



Nedochází
k zatékání
roztoku do krku



Kratší zaoblená
tryska

Stejná účinnost Stejné dávkování



Účinek nastupuje **do 2 minut**
Působí až **12 hodin**



Po prvním otevření lze použít **až do konce doby použití**

*díky nové technologii dávkovací pumpičky

Zkrácená informace dle SPC

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok

Složení: 1 ml roztoku obsahuje 1 mg xylometazolin-hydrochloridu. Jeden vstřík obsahuje 0,14 mg xylometazolin-hydrochloridu.

Indikace: K obnovení průchodnosti nosu při akutní katarální rinitidě, polinóze či jiné alergické rinitidě a při sinusitidě. Při sinusitidě napomáhá odtoku sekretu z vedlejších nosních dutin. Používá se i jako pomocná léčba při otitis media, k dekongesci nazofaryngeální sliznice a k usnadnění rinoskopie.

Dávkování: Dospělí a dospívající od 12 let: Jeden vstřík do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Maximálně 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Otrivin Menthol není určen pro děti mladší 12 let.

Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Nelze užívat u pacientů s transsfenoidální hypofyzektomií nebo u pacientů po operaci dura mater. Rhinitis atrophica sicca. Pacienti s glaukomem s úzkým úhlem.

Upozornění/Opatření: Přípravek by se měl užívat opatrně zejména u pacientů, kteří silně reagují na adrenergické látky, a to insomnií, závratí, třesem, srdeční arytmií nebo zvýšením krevního tlaku. Přípravek se nemá používat déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Delší či nadměrné používání může způsobit kongestivní rebound efekt a/nebo atrofii nosní sliznice. Přípravek se má používat s opatrností u pacientů s hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním, hypertyreózou, diabetem mellitem, feochromocytomem, u pacientů s hyperplazií prostaty, léčených IMAO nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů, u pacientů léčených tricyklickými a tetracyklickými antidepresivy. V těchto případech by měl být pacient při používání přípravku pod lékařským dohledem. U pacientů se syndromem dlouhého QT intervalu léčených xylometazolinem může být zvýšené riziko závažných komorových arytmií.

Těhotenství/Kojení: Doporučuje se zamezit používání přípravku během těhotenství. V období kojení se má používat pouze na doporučení lékaře.

Interakce: Systémové účinky xylometazolinu mohou být zesilovány současným podáním inhibitorů MAO. V případě předávkování může dojít až k rozvoji hypertenzní krize. U pacientů, kterým jsou podávány IMAO nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů, je potřeba opatrnosti. Tricyklická a tetracyklická antidepresiva: Souběžné podávání může mít za následek zvýšení sympatomimetického účinku těchto přípravků (včetně xylometazolinu), a proto se nedoporučuje.

Nežádoucí účinky: Časté: bolest hlavy, místní podráždění nosní sliznice či suchá nosní sliznice, nauzea, lokální pocit pálení. Méně časté: epistaxe. Velmi vzácné: hypersenzitivní reakce (angioedém, vyrážka, pruritus), přechodné poruchy vidění, arytmie, tachykardie.

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Registrační číslo: 69/251/13-C

Datum poslední revize textu: 18.9.2024

Držitel rozhodnutí o registraci:

Haleon Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

V případě otázek kontaktujte prosím:

Haleon Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,
e-mail: mystory.cz@haleon.com.

Případné nežádoucí účinky prosím hláste na: SafetyReportingEMEA@haleon.com.

Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností Haleon. ©2025 skupina společností Haleon nebo poskytovatel příslušné licence.

Datum vypracování materiálu: 08/2025

PM-CZ-OTRI-25-00016