


Program



XXI. ROČNÍK KURSU KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ

7.-8. června 2022

Hotel Dvořák, Tábor

Záštit

Centrum extrapyramidových onemocnění (EXPY)

Pořadatel

MH Consulting s.r.o.

Prezident kongresu



doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.


Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
www.mhconsulting.cz



Partneři a vystavovatelé

AbbVie s.r.o.	1	AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH - organizační složka	4	Desitin Pharma, spol. s r.o.	2	Krka ČR, s.r.o	5	Medis Pharma s.r.o.	3	PHARMAGEN CZ, s.r.o.	6	STADA PHARMA CZ s.r.o.	9
---------------	---	--	---	------------------------------	---	----------------	---	---------------------	---	----------------------	---	------------------------	---



Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po naskenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficiální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po naskenování QR kódu níže:



Pondělí

06.06.2022

	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
📍 Foyer				Stavba stánků 21:00 - 23:00		
Registrace firem						

07. 06. 2022

07. 06. 2022

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00				
📍 Registration de ...			Registrace účastníků 07:45 - 14:30																			
📍 Hlavní sál			Blok 1 08:30 - 10:00			Blok 2 10:30 - 12:00		Opicapon -.. 12:00 - 12:15			Blok 3 13:30 - 15:00			Blok 4 15:30 - 17:30								
📍 Foyer	Stavba stánků 06:00 - 08:30		Expozice vystavovatelů 08:30 - 18:00																			
📍 Občerstvení					Coffee Bre.. 10:00 - 10:30						Oběd 12:15 - 13:30						Coffee Bre.. 15:00 - 15:30				Večeře 19:00 - 22:00	
	Registrace firem	Ústní sdělení	Oběd	Coffee Break	Večeře	Registrace firem a účastníků			Symposium													

Středa

08. 06. 2022

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Občerstvení					Coffee Bre.. 10:00 - 10:30			Oběd 12:15 - 13:45										
Registration de ...			Registrace účastníků 08:15 - 10:00															
Hlavní sál			Blok 5 08:30 - 10:00			Blok 6 10:30 - 12:00	Uzavření k.. 12:00 - 12:15											
Foyer			Expozice vystavovatelů 08:30 - 12:00						Demontáž stánků 12:15 - 17:00									
Ústní sdělení	Konec akce	Registrace firem	Oběd	Coffee Break	Registrace firem a účastníků													

Pondělí

06. 06. 2022

Registration desk

Hlavní sál



Foyer

Občerstvení

21:00-23:00



STAVBA STÁNKŮ

📍 Foyer | Registrace firem

Úterý

07. 06. 2022

Registration desk



Hlavní sál

Foyer

Občerstvení

08:30-10:00



BLOK 1

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

ESENCIÁLNÍ TREMOR, HUNTINGTONOVA NEMOC - HISTORIE

Růžička E., Roth J.

45 min

SOUČASNÉ ZOBRAZOVACÍ METODY U EXTRAPYRAMIDOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Dušek P.

45 min

10:30-12:00



BLOK 2

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

DIAGNOSTIKA PARKINSONOVY NEMOCI

Mašková J.

30 min

TERAPIE PARKINSONOVY NEMOCI

Brožová H.

30 min

INTERVENČNÍ LÉČBA PARKINSONOVY NEMOCI (MOŽNOSTI, INDIKACE, KAZUISTIKY)

Havránková P., Růžička F.

30 min

12:00-12:15



OPICAPON - NOVÝ INHIBITOR COMT V LÉČBĚ PARKINSONOVY NEMOCI (SYMPOZIUM MEDIS PHARMA S.R.O.)

📍 Hlavní sál | Symposium

MUDr. Petra Havránková, Ph.D. - Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úterý

07. 06. 2022

Registration desk



Hlavní sál

Foyer

Občerstvení

13:30-15:00



BLOK 3

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

PROPEDEUTIKA FUNKČNÍCH PORUCH HYBNOSTI

Serranová T.

45 min

SOCIOGENNÍ TIKY- NOVÁ EPIDEMIE?

Růžička E.

45 min

15:30-17:30



BLOK 4

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

KAZUISTIKY

.

90 min

NON-EXPY KOMPLIKACE EXPY ONEMOCNĚNÍ

Ulmanová O.

30 min

Úterý

07. 06. 2022

Registration desk

Hlavní sál



Foyer

Občerstvení

06:00-08:30



STAVBA STÁNKŮ

📍 Foyer | Registrace firem

08:30-18:00



EXPOZICE VYSTAVOVATELŮ

📍 Foyer | Registrace firem

Úterý

07. 06. 2022

Registration desk

Hlavní sál

Foyer

📍 Občerstvení

10:00-10:30



COFFEE BREAK

📍 Občerstvení | Coffee Break

12:15-13:30



OBĚD

📍 Občerstvení | Oběd

15:00-15:30



COFFEE BREAK

📍 Občerstvení | Coffee Break

19:00-22:00



VEČEŘE

📍 Občerstvení | Večeře

Úterý

07. 06. 2022



Registration desk

Hlavní sál

Foyer

Občerstvení

07:45-14:30



REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

📍 Registration desk | Registrace firem a účastníků

Středa

08. 06. 2022

Občerstvení

Registration desk

📍 Hlavní sál

Foyer

08:30-10:00



BLOK 5

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

STEREOTYPIE

Roth J.

30 min

GENDY- DIAGNOSTIKA FAMILIÁRNÍCH A GENERALIZOVANÝCH DYSTONICKÝCH SYNDROMŮ V ČR

Jech R.

60 min

10:30-12:00



BLOK 6

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

NEUROPSYCHIATRICKÝ WORKSHOP

Uhrová T.

90 min

12:00-12:15



UZAVŘENÍ KURZU

📍 Hlavní sál | Konec akce

Středa

08. 06. 2022

Občerstvení

Registration desk

Hlavní sál

📍 Foyer

08:30-12:00



EXPOZICE VYSTAVOVATELŮ

📍 Foyer | Registrace firem

12:15-17:00



DEMONTÁŽ STÁNKŮ

📍 Foyer | Registrace firem

Středa

08. 06. 2022

📍 **Občerstvení** Registration desk Hlavní sál Foyer

10:00-10:30



COFFEE BREAK

📍 Občerstvení | Coffee Break

12:15-13:45



OBĚD

📍 Občerstvení | Oběd

Středa

08. 06. 2022

Občerstvení



Registration desk

Hlavní sál

Foyer

08:15-10:00



REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

📍 Registration desk | Registrace firem a účastníků



JSEM EMMANUEL MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je opět
ovládat počítač
pravou rukou.



Emmanuel, 44 let
Pacient se spasticitou



JSEM VICTORIA MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je hledět
rovně před sebe
bez námahy.

Victoria, 75 let
Pacientka s cervikální dystonií



JSEM HELMUT MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je opět
povečřet
s přáteli.



Helmut, 79 let
Pacient se sialoreou



Jaké jsou cíle vašich pacientů? Posuňme terapii botulotoxinem na vyšší úroveň.



Zkrácená informace o přípravku (nenahrazuje SPC).

Xeomin®

Název přípravku: Xeomin® 100 jednotek prášek pro injekční roztok. **Složení:** jedna injekční lahvička obsahuje Toxinum botulinicum (incobotulinum) typus A (150 kD), bez komplexotvorných proteinů 100 jednotek. **Indikace:** U dospělých symptomatická léčba blefarospasmu a hemifaciálního spasmu, cervikální dystonie převážně rotační formy (torticollis spastica), spasticity horních končetin a chronické sialorey v důsledku neurologických poruch. U dětí a dospívajících ve věku od 2 do 17 let s hmotností > 12 kg k symptomatické léčbě chronické sialorey v důsledku neurologických poruch / poruch nervového vývoje. **Dávkování a způsob podání:** Jednotkové dávky nejsou pro přípravek Xeomin® zaměřitelné s jinými přípravky obsahujícími botulotoxin typu A. Přípravek smí podávat pouze lékař s vhodnou kvalifikací a potřebnou zkušeností s aplikací botulotoxinu. Optimální dávku, frekvenci a počet míst vpichu určí lékař pacientovi individuálně. Nesmí být překročeny jednorázové individuální dávky. Při léčbě dětí a dospívajících se má používat ultrazvuková kontrola. Dětem a dospívajícím může být před injekcí náhodně aplikována lokální anestezie v kombinaci se sedací. Pro každou aplikaci a skupinu pacientů (dospělí, dospívající a děti) je dále uveden schéma, postup a lokalizace specifická a individuální, pro informace k dávkování a dávkovacím schématickým je nutné číst přílohu verze SPC. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivo nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, generalizované poruchy svalové aktivity (např. myasthenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom), infekce v místě aplikace, **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Přípravek nesmí být podán do cévy. Před aplikací je nutné respektovat anatomická specifika pacienta. Opatření je nutno u pacientů s poruchou srážlivosti nebo léčebnými antikoagulanty. Upozornění se týká lokálních účinků a vzdáleného šíření toxinu, které mohou mít související nežádoucí účinky a mohou být život ohrožující. Byly hlášeny případy úmrtí, které byly v některých případech spojeny s dysfagií, pneumonií. Další upozornění se týkají výskytu značné tělesné slabosti, dysfagie, nutnosti opatrnosti u některých onemocnění jako AMLs, neuromuskulární dysfunkce, svalové atrofie, hypersenzitivních reakcí, tvorby protěles. Pro úplné informace a upozornění k jednotlivým indikacím viz příloha verze SPC. **Interakce:** Nebyly provedeny žádné interakční studie. Účinek botulotoxinu může být teoreticky potencionován amnoglykosidovými antibiotiky nebo jinými léčivými přípravky zasahujícími do nervosvalového přenosu. Periferní myorelaxancia, radioterapie, anticholinergika. **Těhotenství a kojení:** Přípravek v těhotenství má být používán pouze v případě, že potenciální přínos převládá nad rizikem a užití během kojení není doporučeno. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Mírný až středně silný vliv. Pacienti mají být poučeni. **Nežádoucí účinky:** Suché oči, rozostřené vidění, porucha vidění, suchost v ústech, bolest v místě injekce, infekce horních cest dýchacích, bolest hlavy, přepřekážka, závrť, chvění, nauzea, hyperhidróza, bolest v krku, svalová slabost, myalgie, svalová křeč, muskuloskeletální ztuhlost, astenie, parestezie. **Doba použitelnosti:** 4 roky. **Uchovávání:** Při teplotě do 25 °C. **Balení a druh obalu:** injekční lahvička (sklo třídy II) se zátkou (brombutylová pryž). **Velikost balení:** 1 injekční lahvička obsahující 100 jednotek. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt/Main, P.O. Box 11 13 53, 60048 Frankfurt/Main, Německo. **Registrační číslo:** 63/138/14-C. **Datum registrace/prodloužení registrace:** 23.7.2014/7.6.2016. **Datum poslední revize textu:** 10.2.2022. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, vyšší a podmínky úhrady naleznete v aktuálním Seznamu léčiv a PZLU hrazených ze zdravotního pojištění na www.zakl.cz. Před předepsáním léku se, prosím, seznáme s podrobnými informacemi v písemném Souhrnu údajů o přípravku. Zásadně držitel rozhodnutí o registraci: Desitin Pharma, spol. s r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, telefon: +420 222 245 375, email: desitin@desitin.cz

Datum přípravy: březen 2022

XEOMIN/16/903/22

Nový COMT-inhibitor

1x
denně



Brzy dostupný v ČR!

Zkrácené informace o léčivém přípravku


Název léčivého přípravku: Ongentys 25 mg tvrdé tobolky; Ongentys 50 mg tvrdé tobolky.
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje opicaponum 25 mg (50 mg). **Terapeutické indikace:** Ongentys je indikován jako přídavná léčba k přípravkům obsahujícím kombinace levodopa/inhibitory DOPA-dekarboxylázy (DDCI) u dospělých pacientů s Parkinsonovou chorobou s motorickými fluktuacemi na konci dávkovacího intervalu („end-of-dose“ fluktuace), které nelze těmito kombinacemi stabilizovat. **Dávkování a způsob podání:** Dávkování: Doporučená dávka je 50 mg denně před spaním nejméně jednu hodinu před nebo po kombinacích levodopy. Způsob podání: Perorální podání. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. SPC. Feochromocytom, paragangliom nebo jiné novotvary vylučující katecholaminy. Neuroleptický maligní syndrom a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze. Souběžné užívání s jinými inhibitory monoaminoxidázy (MAO-A a MAO-B, např. fenelzin, tranylcypromin a moklobemid) než s těmi, které jsou určeny k léčbě Parkinsonovy choroby. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Ongentys se vždy podává jako přídavná léčba k léčbě levodopou. Upozornění platná pro léčbu levodopou je tedy třeba brát v úvahu i při léčbě přípravkem Ongentys. Opikapon posiluje účinky levodopy. Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo jinou dopaminergní léčbou, se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatového a nutkavého přejídání. Ve studiích s nitrokatcholovými inhibitory katechol-O-methyltransferázy (COMT) byly hlášeny nárůsty hodnot jaterních enzymů. Ongentys obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat. **Interakce:** Použití s jinými IMAO je kontraindikováno. Další interakce viz SPC. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté: dyskineze. Časté: abnormální sny, halucinace, vizuální halucinace, insomnie, závrať, bolest hlavy, somnolence, ortostatická hypotenze, zácpa, sucho v ústech, zvracení, svalové spasmy, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávejte v původním blistru/dobře uzavřené lahvičce k ochraně před vlhkostí. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Bial - Portela & C^o, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugalsko. **Registrační číslo(a):** EU/1/15/1066/001-010. **Datum revize textu:** 18. 2. 2021. **Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Tento léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.** Dříve než předepíšete tento přípravek, seznámte se s úplným souhrnem údajů o přípravku, který je k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky <http://www.ema.europa.eu> nebo na adrese držitele rozhodnutí o registraci.

Medis Pharma s.r.o.

Národní 60/28, 110 00 Praha 1, www.medis.com

CZ-ONG-0422-001

 **MEDIS Therapeutics**



► **LECIGIMON**

Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která je doprovázena těžkými motorickými fluktuacemi a hyperkinezí nebo dyskinezí, pokud dostupné kombinace perorálních antiparkinsonik neposkytují uspokojivé výsledky!



Kontinuální dopaminergní stimulace (CDS)²

Z klinických studií vyplývá, že **kontinuální podávání levodopy je fyziologičtější než intermitentní (perorální) podávání** a snižuje riziko motorických komplikací²⁻⁴

Reference: 1. Lecigimon Souhrn údajů o přípravku, poslední revize textu 8. 7. 2021 2. Olanow CW, et al. Mov Disord. 2020; Aug 20. doi: 10.1002/mds.28215; 3. Olanow CW, et al. Lancet Neurol. 2006;5(8):677-87; 4. Schwartz M, Sabatay S. Isr Med Assoc J. 2012;14(3):175-9.

Zkrácená informace o přípravku Lecigimon 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml intestinální gel

Indikační skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty. **Složení:** 1 ml obsahuje levodopum 20 mg, carbidopum monohydricum 5 mg (odpovídá carbidopum anhydricum 4,6 mg) a entacaponum 20 mg. 47 ml (1 kazeta) obsahuje levodopum 940 mg, carbidopum monohydricum 235 mg a entacaponum 940 mg. **Indikace:** léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která je doprovázena těžkými motorickými fluktuacemi a hyperkinezí nebo dyskinezí, pokud dostupné kombinace perorálních antiparkinsonik neposkytují uspokojivé výsledky. **Dávkování a způsob užívání:** dávka má být titrována tak, aby se dosáhlo optimální klinické odpovědi pro konkrétního pacienta. Celková denní dávka přípravku Lecigimon je složena ze tří individuálně přizpůsobených dávek: *ranního bolusu*, *průběžné udržovací dávky* a *dalších bolusových dávek*. Lecigimon lze podávat až 24 hod/den, je-li takové podání lékařsky odůvodněno. Maximální doporučená denní dávka je 100 ml (což odpovídá 2000 mg levodopy, 500 mg monohydrátu karbidopy a 2000 mg entakaponu – viz SPC bod 4.4). **Ranní dávka:** je podávána pumpou pro rychlé dosažení terapeutické hladiny (během 30 minut). Dávka se upravuje v přírůstcích po 0,1 ml (2 mg). Celková ranní dávka je obvykle 5–10 ml, což odpovídá 100–200 mg levodopy a nemá přesáhnout 15 ml (300 mg levodopy). **Kontinuální udržovací dávka:** je podávána pumpou, aby byla udržována terapeutická hladina. Udržovací dávka se upravuje v přírůstcích po 2 mg za hodinu (0,1 ml/h) a je obvykle 0,7–5 ml za hodinu (15–100 mg levodopy za hodinu). Maximální doporučená denní dávka je 100 ml (2000 mg levodopy). **Další bolusové dávky a Titrace během převodu z kombinace levodopa/karbidopa na přípravek Lecigimon** – viz SPC bod 4.3. Lecigimon je gel pro kontinuální intestinální podání (podání do duodena nebo horního jejunu). Pro podávání přípravku smí být používána pouze pumpa Crono LECIG (CE 0476). Návod s instrukcemi pro používání přenosné pumpy je dodáván spolu s pumpou. Kazeta je určena pouze k jednorázovému použití a nesmí se používat déle než 24 hodin. Dávkovací pumpu s vloženou kazetou je možné nosit na těle až 16 hodin. Po otevření je možné kazetu používat i následující den, avšak nejdéle 24 hodin po prvním otevření. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, glaukom s uzavřeným úhlem, těžké srdeční selhání, těžká srdeční arytmie, akutní cévní mozková příhoda, těžká porucha funkce jater, užívání neselektivních inhibitorů MAO a selektivních inhibitorů MAO typu A, feochromocytom, hypertyreóza, Cushingův syndrom, neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza, suspekt ní neurčené kožní léze nebo melanom v anamnéze. **Interakce:** při používání současně s následujícími léčivými přípravky je třeba opatrnosti: antihypertenziva, antidepresiva, anticholinergika, jiná antiparkinsonika, antagonisté dopaminových receptorů (některá antipsychotika, např. fenothiaziny, butyrofenony a risperidon, a antiemetika, např. metoklopramid), benzodiazepiny, isoniazid, fenytoin a papaverin mohou snižovat terapeutický účinek levodopy. **Hlavní nežádoucí účinky:** snížení tělesné hmotnosti, obavy, úzkost, deprese, insomnie, dyskineze, zhoršení Parkinsonovy choroby/ zhoršení parkinsonismu, ortostatická hypotenze, nauzea, zácpa, průjem, bolest svalů a tkání a muskuloskeletální bolest, chromaturie. Nežádoucí účinky spojené se systémem k aplikaci a s jeho zavedením do organismu – viz SPC bod 4.8. **Upozornění:** Lecigimon se nedoporučuje k léčbě polékových extrapyramidových účinků. Lecigimon podávat s opatrností pacientům s ischemickou chorobou srdeční, s těžkým kardiovaskulárním nebo pulmonálním onemocněním, bronchiálním astmatem, renálním nebo endokrinním onemocněním nebo s anamnézou žaludeční vředové choroby nebo konvulzí. U všech pacientů má být pečlivě sledován rozvoj změn duševního stavu, deprese s tendencí k sebevraždě a jiné závažné duševní změny. Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. Dopaminový dysregulační syndrom (DDS) je návyková porucha, která u některých pacientů léčených kombinací karbidopa/levodopa vede k nadměrnému užívání přípravku. **Těhotenství a kojení:** přípravek se nedoporučuje během těhotenství ani u žen ve fertilním věku nepoužívajících antikoncepci, pokud přínos pro matku nepřeváží nad možnými riziky pro plod. V průběhu léčby přípravkem je třeba se vyvarovat kojení. **Balení na trhu:** 47 ml gelu v polypropylenové kazetě. Širší konec je opatřen píšťkovým uzávěrem z polyisoprenové pryže a otvor je uzavřen zátkou z polypropylenu nebo akrylonitrilbutadienstyrenu. Balení obsahuje 7 kazet. **Podmínky uchovávání:** uchovávejte v chladničce (2–8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Datum poslední revize textu:** 8. 7. 2021 **Držitel rozhodnutí o registraci:** LobSor Pharmaceuticals AB, Kålsångsgränd 10 D, SE-753 19 Uppsala, Švédsko. **Registrační číslo:** 27/480/20-C **Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznámte s úplným souhrnem údajů o přípravku.**



Zastoupení v ČR:
STADA PHARMA CZ s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, tel.: +420 257 888 111, www.stada-pharma.cz

Platinový partner

abbvie

Zlatý partner

 MEDIS healthy values

Stříbrný partner


DESITIN
SUCCESS IN CNS


STADA

Vystavovatel

 **AOP**
HEALTH

 **KRKA**

 **Pharma**
Gen EVER

Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce