Program

ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE II 2022

22.-23. listopadu 2022

Hotel Kraví Hora

Partneři a vystavovatelé

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.	2	IQVIA RDS Czech Republic s.r.o.	3	sanofi-aventis s.r.o.	1

Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po nascenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po nascenování QR kódu níže:

Úterý

22. 11. 2022

06:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hlavní sál	Registrace.. 09:30 - 10:00	Blok I 10:00 - 11:30	Přestávka .. 11:30 - 11:45	Blok II 11:45 - 12:30	Oběd 12:30 - 14:00	(Sympozium.. 14:00 - 14:20	Blok III 14:20 - 15:35	Přestávka .. 15:35 - 16:00	Blok IV 16:00 - 17:50	Novinky z .. 17:50 - 18:15	Večeře 19:30 - 23:00

Symposium | **Registrace firem a účastníků** | **Coffee Break** | **Oběd** | **Večeře** | **Ústní sdělení** | **Jiné**

Středa

23. 11. 2022

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Hlavní sál			Symposium 08:30 - 09:00	Blok V 09:00 - 10:30	Přestávka .. 10:30 - 10:45	Blok VI 10:45 - 12:00	Oběd 12:00 - 14:00											

Coffee Break | Oběd | Ústní sdělení | Symposium

Úterý

22. 11. 2022

Hlavní sál

09:30-10:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM
Hlavní sál | Registrace firem a účastníků

10:00-11:30

BLOK I
Hlavní sál | Ústní sdělení

EPILEPSIE
Brázdil M.

11:30-11:45

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Hlavní sál | Coffee Break

11:45-12:30

BLOK II
Hlavní sál | Ústní sdělení

EPILEPSIE
Brázdil M.

12:30-14:00

OBĚD
Hlavní sál | Oběd

14:00-14:20

(SYMPOZIUM ANGELINI PHARMA ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.)
Hlavní sál | Symposium

Úterý

22. 11. 2022

Hlavní sál

14:20-15:35

BLOK III
Hlavní sál | Ústní sdělení

NEUROOTOLOGIE
Jeřábek J.

15:35-16:00

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Hlavní sál | Coffee Break

16:00-17:50

BLOK IV
Hlavní sál | Ústní sdělení

NEUROOTOLOGIE
Danková M., Vyhnálek M.

17:50-18:15

NOVINKY Z VÝBORU ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Hlavní sál | Jiné

19:30-23:00

VEČEŘE
Hlavní sál | Večeře

Středa

23. 11. 2022

Hlavní sál

08:30-09:00

SYMPOSIUM
Hlavní sál | Symposium

09:00-10:30

BLOK V
Hlavní sál | Ústní sdělení

DEMENCE
Vyhnálek M., Nikolai T.

10:30-10:45

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Hlavní sál | Coffee Break

10:45-12:00

BLOK VI
Hlavní sál | Ústní sdělení

DEMENCE
Vyhnálek M., Nikolai T.

12:00-14:00

OBĚD
Hlavní sál | Oběd

NEJSTE SI JISTÍ, ZDA JE TO POMPEHO NEMOC?

Diagnostika adultní formy Pompeho nemoci je pro svůj vzácný výskyt a fenotypovou diverzitu klinických příznaků často velice náročná. Pacienti jsou často roky nesprávně vedeni pod jinými mylnými diagnózami.

Níže jsou uvedeny některé diagnózy, které mají podobné příznaky a symptomy jako Pompeho nemoc.

	SVALOVÁ SLABOST	POTÍŽE S CHŮZÍ	ZVÝŠENÁ HLADINA CK (KREATINKINÁZA)	RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE	POTÍŽE S POLYKÁNÍM	INTOLERANCE FYZICKÉ ZÁTĚŽE
MYOPATIE (VŠEOBECNĚ)[9–13]	●	●		●	●	●
DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE[3,12,14–16]	●	●	●	●	●	●
PLETENCOVÁ SVALOVÁ DYSTROFIE[4,14,18]	●	●	●			
MYASTENIE GRAVIS[5,16,17]	●	●		●	●	●
ZÁNĚTLIVÉ MYOPATIE[6,19–21,23]	●		●		●	●
POLYMYOZITIDA[7,16,21–23]	●	●	●		●	●
POMPEHO NEMOC[8,16]	●	●	●	●	●	●

Reference: 1. AANEM *Muscle Nerve*. 2009;40(1):149–160. **2**. Kishnani PS et al. *Am J Med Genet A*. 2013;161A(10):2431–43. **3**. Mah JK et al. *Neuromuscul. Disord*. 2014;24(6):482–491. **4**. Limb-girdle muscular dystrophy. [online] [cit.17.10.2014]:http://ghr.nlm.nih.gov/condition/limb-girdle-muscular-dystrophy/show/print. **5**. Myasthenia gravis. [online] [cit.17.10.2014]: http://ghr.nlm.nih.gov/condition/myasthenia-gravis. **6**. Furst D et al. *Muscle & Nerve*. 2012;45:6/76–683. **7**. Bernatsky S et al. *Ann Rheum Dis*. 2009;68:1192–1196. **8**. Pompe disease. [online] [cit.17.10.2014]: http://ghr.nlm.nih.gov/condition/pompe-disease. **9**. Chaudhuri A et al. *Lancet*, 2004;363(9413):978–988. **10**. NIH Walking abnormalities information page. [online] [cit.17.10.2014]: https://medlineplus.gov/ency/article/003199.htm. **11**. Hereditary myopathy with early respiratory failure. [online] [cit.17.10.2014]: http://ghr.nlm.nih.gov/condition/hereditary-myopathy-with-early-respiratory-failure. **12**. Muscle disorders affecting oral and pharyngeal swallowing. [online] [cit.16.10.2014]: https://www.nature.com/gimo/contents/pt1/full/gimo35.html. **13**. Feasson L et al. *Annales de readaptation et de medecine physique*. 2006;49:375–384. **14**. Bernabei MS et al. *Compr Physiol*. 201 1;1(3):1353–1363. **15**. Ozawa E et al. *Mol Cell Biochem*. 1999;190(1–2):143–151. **16**. Kishnani PS et al. *Genet Med*. 2006;8(5):267–288. **17**. Gilchrist JM. *Semin Respir Grit Care Med*. 2002;23(3):191–200. **18**. Pegoraro E, Hoffman EP. Limb-girdle muscular dystrophy overview. [online] [cit.16.10.2014]: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1408. **19**. Smoyer-Tomic KE et al. *BMC Musculoskelet Disord*. 2012:13:103. doi: 10.1186/1471–2474–13–103. **20**. NINDS inflammatory myopathies information page. [online] [cit.17.10.2014]: https://www.ninds.nih.gov/disorders/All-Disorders/Inflammatory-Myopathies-Information-Page. **21**. Mastaglia FL, Phillips BA. *Rheum Dis Clin North Am*. 2002;28(4):723–741. **22**. Polymyositis information page. [online] [cit.16.10.2014]: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditionsand-diseases/polymyositis. **23**. Oh TH et al. *Mayo Clin Proc*. 2007;82(4):441–447

Zkrácená informace o přípravku

Název přípravku: Myozyme 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. **Léčivá látka:** alglucosidasum alfa. **Indikace:** Přípravek Myozyme je indikován pro dlouhodobou enzymatickou substituční léčbu u pacientů s potvrzenou diagnózou Pompeho nemoci. Přípravek Myozyme je indikován u dospělých i dětských pacientů všech věkových kategorií. **Kontraindikace:** Život ohrožující hypersenzitivita (anafylaktická reakce) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, pokud opětovné nasazení přípravku znovu vyvolalo příslušnou reakci. **Dávkování a způsob podání:** Doporučená dávka přípravku alglucosidasum alfa je 20 mg/kg tělesné hmotnosti a aplikuje se jedenkrát za 2 týdny intravenózně. Doporučuje se začít podávat infuzi počáteční rychlostí 1 mg/kg/hod a postupně, pokud se neobjeví příznaky reakcí souvisejících s infuzí, dávkování zvyšovat o 2 mg/kg/hod každých 30 minut, a to až do maximální rychlosti 7 mg/kg/hod. **Zvláštní upozornění a opatření pro užití:** Závažné a život ohrožující anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku byly během infuzí přípravku Myozyme hlášeny u pacientů s infantilní i pozdní formou nemoci. Při podávání přípravku Myozyme je z důvodu možnosti závažných reakcí souvisejících s infuzí nutné mít připravená vhodná lékařská podpůrná opatření, včetně přístroje pro kardiopulmonální resuscitaci. Jestliže se vyskytnou závažné hypersenzitivní/ anafylaktické reakce, okamžitě přerušte infuzi přípravku Myozyme a zahajte odpovídající léčbu za dodržení lékařských standardů. Pacienti s pokročilou Pompeho nemocí mohou mít zhoršenou srdeční a respirační funkci a tak vyšší riziko vzniku závažných komplikací způsobených reakcemi souvisejícími s infuzí a mají být proto během podávání přípravku Myozyme pečlivě monitorováni. Objeví-li se reakce imunitního systému, je třeba zvážit rizika a přínos opětovného zahájení podávání přípravku. Sledovatelnost: Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. **Interakce:** Nebyly provedeny žádné formální studie interakcí. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Přípravek Myozyme nemá být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Při aplikaci přípravku Myozyme se doporučuje přerušit kojení. Neexistují žádné klinické údaje o účinku alglukosidázy alfa na fertilitu. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. **Nežádoucí účinky:** Infantilní forma Pompeho nemoci: závažné reakce na infuzi včetně kopřivky, šelestu, tachykardie, snížené saturace kyslíkem, bronchospasmu, tachypnoe, periorbitálního edému a hypertenze. Časté: agitovanost, tremor, zrudnutí, hypertenze, bledost, tachypnoe, kašel, zvracení, dávení, nauzea, kopřivka, vyrážka, erytém, makulopapulózní vyrážka, makulózní vyrážka, papulózní vyrážka, pruritus, podrážděnost, zimnice, zvýšená srdeční frekvence, zvýšený krevní tlak, zvýšená tělesná teplota, pyrexie, snížená saturace kyslíkem. Pozdní forma Pompeho nemoci: časté: přecitlivělost, závrať, parestezie, bolest hlavy, zrudnutí, pocit zúžení hrdla, průjem, zvracení, nauzea, kopřivka, papulózní vyrážka, pruritus, hyperhidróza, svalové spazmy, svalové fascikulace, myalgie, pyrexie, hrudní diskomfort, periferní otok, lokální zduření, únava, pocit horka, zvýšený krevní tlak. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). **Balení:** 50 mg prášku v injekční lahvičce. **Registrační čísla:** EU/1/06/333/001–003. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nizozemsko. **Datum poslední revize textu:** 25. 08. 2022. Přípravek je vydáván na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. **Další informace jsou k dispozici na adrese:** sanofi-aventis, s. r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111, fax: 233 086 222, nebo na www.sanofi.cz. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 086 111, fax: +420 233 086 222, e-mail: cz-info@sanofi.com
Určeno pro odbornou veřejnost. MAT-CZ-2200153-2.0-10/2022.

Poznámky:

Poznámky:

Platinový partner

Angelini Pharma

Zlatý partner

angela
ZANECHEJTE SVŮJ ODKAZ

sanofi

Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce