Program



XXII. ROČNÍK KURSU KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ

18.-19. května 2023

Hotel Dvořák, Tábor

Záštita

Centrum extrapyramidových onemocnění (EXPY)

Pořadatel

MH Consulting s.r.o.

Prezident kongresu

doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
www.mhconsulting.cz

Partneři a vystavovatelé

AbbVie s.r.o. 8	AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH - organizační složka 1	CARDION s.r.o. 5	Desitin Pharma, spol. s r.o. 2	Medis Pharma s.r.o. 6	Medtronic Czechia s.r.o. 7	PHARMAGEN CZ, s.r.o. 3	STADA PHARMA CZ s.r.o. 4



Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po nascenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po nascenování QR kódu níže:

Čtvrtek

18. 05. 2023

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Hlavní sál			Blok 1 08:30 - 10:00			Blok 2 10:30 - 12:00		Blok 3 13:30 - 14:45	(Sympozium.. 14:45 - 15:00		Blok 4 15:30 - 17:30							
Foyer	Montáž stánků 06:00 - 08:30		Expozice vystavovatelů 08:30 - 17:30															
Občerstvení					Coffee Bre.. 10:00 - 10:30		Oběd 12:00 - 13:30			Coffee Bre.. 15:00 - 15:30					Společenský večer 20:00 - 23:00			
Registration de ...			Registrace účastníků 07:45 - 14:30															

Symposium | **Ústní sdělení** | **Coffee Break** | **Oběd** | **Večeře** | **Registrace firem a účastníků** | **Registrace firem**

Pátek

19. 05. 2023

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Hlavní sál			Blok 5 08:00 - 10:00			Blok 6 10:30 - 12:00												
Foyer			Expozice vystavovatelů 08:00 - 12:00				Deontáž stánků 12:00 - 14:00											
Občerstvení					Coffee Bre.. 10:00 - 10:30			Oběd 12:30 - 14:00										
Registration de ...			Registrace účastníků 07:45 - 10:00															

Ústní sdělení | Coffee Break | Oběd | Registrace firem a účastníků | Registrace firem

Čtvrtek

18. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | Občerstvení | Registration desk

08:30-10:00

BLOK 1
Hlavní sál | Ústní sdělení

CHOREA – OD SYMPTOMU K DIAGNÓZE — 45 min
Roth J.

DMO V AMBULANCI EXPY SPECIALISTY — 45 min
Jech R.

10:30-12:00

BLOK 2
Hlavní sál | Ústní sdělení

LÉČBA MOTORICKÝCH PŘÍZNAKŮ PARKINSONOVY NEMOCI - UPDATE — 45 min
Dušek P., Serranová T.

LÉČBA NON-MOTORICKÝCH PŘÍZNAKŮ PARKISONOVY NEMOCI — 45 min
Brožová H.

13:30-14:45

BLOK 3
Hlavní sál | Ústní sdělení

INTERVENČNÍ LÉČBA PARKINSONOVY NEMOCI V KAZUISTIKÁCH — 90 min
Havránková P., Růžička F.

14:45-15:00

(SYMPOZIUM STADA PHARMA CZ S.R.O.)
Hlavní sál | Symposium

Čtvrtek

18. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | Občerstvení | Registration desk

15:30-17:30

BLOK 4
Hlavní sál | Ústní sdělení

REVIZE DIAGNÓZY A ÚPRAVY TERAPIE V KAZUISTIKÁCH 120 min
Ulmanová O.

Čtvrtek

18. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | Občerstvení | Registration desk

06:00-08:30

MONTÁŽ STÁNKŮ
Foyer | Registrace firem

08:30-17:30

EXPOZICE VYSTAVOVATELŮ
Foyer | Registrace firem

Čtvrtek

18. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | **Občerstvení** | Registration desk

10:00-10:30	**COFFEE BREAK** Občerstvení | Coffee Break
12:00-13:30	**OBĚD** Občerstvení | Oběd
15:00-15:30	**COFFEE BREAK** Občerstvení | Coffee Break
20:00-23:00	**SPOLEČENSKÝ VEČER** Občerstvení | Večeře

Čtvrtek

18. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | Občerstvení | Registration desk

07:45-14:30

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Registration desk | Registrace firem a účastníků

Pátek

19. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | Občerstvení | Registration desk

08:00-10:00

BLOK 5
Hlavní sál | Ústní sdělení

EXTRAPYRAMIDOVÁ ROZCVIČKA – ZAJÍMAVÉ PŘÍZNAKY — 30 min
Růžička E.

VÝŽIVA U PACIENTŮ S EXPY ONEMOCNĚNÍM — 60 min
Klempíř J.

10:30-12:00

BLOK 6
Hlavní sál | Ústní sdělení

REVIZE DIAGNÓZY A ÚPRAVY TERAPIE V KAZUISTIKÁCH — 30 min
Ulmanová O.

EXPLORACE PSYCHOTICKÝCH PŘÍZNAKŮ A PROJEVŮ PKI — 60 min
Uhrová T.

Pátek

19. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | Občerstvení | Registration desk

08:00-12:00

EXPOZICE VYSTAVOVATELŮ
Foyer | Registrace firem

12:00-14:00

DEONTÁŽ STÁNKŮ
Foyer | Registrace firem

Pátek

19. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | **Občerstvení** | Registration desk

10:00-10:30

COFFEE BREAK
Občerstvení | Coffee Break

12:30-14:00

OBĚD
Občerstvení | Oběd

Pátek

19. 05. 2023

Hlavní sál | Foyer | Občerstvení | Registration desk

07:45-10:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Registration desk | Registrace firem a účastníků

MANAGE-PD

Parkinson's Foundation

abbvie

Použití nástroje je určeno výhradně pro licencované zdravotnické pracovníky v České republice a není nabízen jako lékařské doporučení pro konkrétního pacienta. Nástroj není určen pro pacienty. O vhodné péči o pacienta a možnostech léčby může rozhodovat pouze zdravotnický pracovník, který uplatňuje nezávislý klinický úsudek s ohledem na jedinečné vlastnosti každého pacienta. V případě, že budete postupovat ve Vaší praxi s použitím nástroje MANAGE-PD, prosíme, vezměte na vědomí, že tak činíte výhradně na svou vlastní odpovědnost. Z tohoto důvodu AbbVie s.r.o. nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, hmotnou či nehmotnou, vzniklou v přímé či nepřímé souvislosti s použitím tohoto nástroje. **Pokud z jakéhokoli důvodu s tímto ujednáním nesouhlasíte, prosíme, nástroj MANAGE-PD nepoužívejte**.

MANAGE-PD

Nástroj pro správné načasování změn v léčbě Parkinsonovy nemoci.

Parkinson's Foundation

abbvie

Použití nástroje je určeno výhradně pro licencované zdravotnické pracovníky v České republice a není nabízen jako lékařské doporučení pro konkrétního pacienta. Nástroj není určen pro pacienty. O vhodné péči o pacienta a možnostech léčby může rozhodovat pouze zdravotnický pracovník, který uplatňuje nezávislý klinický úsudek s ohledem na jedinečné vlastnosti každého pacienta. V případě, že budete postupovat ve Vaší praxi s použitím nástroje MANAGE-PD, prosíme, vezměte na vědomí, že tak činíte výhradně na svou vlastní odpovědnost. Z tohoto důvodu AbbVie s.r.o. nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, hmotnou či nehmotnou, vzniklou v přímé či nepřímé souvislosti s použitím tohoto nástroje. **Pokud z jakéhokoli důvodu s tímto ujednáním nesouhlasíte, prosíme, nástroj MANAGE-PD nepoužívejte**.

CZ-ABBV-230014

XEOMIN®
Botulinum neurotoxin type A

Helping patients achieve their goals

JSEM EMMANUEL MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je opět ovládat počítač pravou rukou.

Bez ohledu na etiologii

Emmanuel, 44 let
Pacient se spasticitou

XEOMIN®
Botulinum neurotoxin type A

Helping patients achieve their goals

JSEM VICTORIA MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je hledět rovně před sebe bez námahy.

Victoria, 75 let
Pacientka s cervikální dystonií

XEOMIN®
Botulinum neurotoxin type A

Helping patients achieve their goals

JSEM HELMUT MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je opět povečeřet s přáteli.

1. a jediný botulotoxin-A schválený v ČR k léčbě CHRONICKÉ SIALOREY

Helmut, 79 let
Pacient se sialoreou

MERZ

Jaké jsou cíle vašich pacientů? Posuňme terapii botulotoxinem na vyšší úroveň.

DESITIN
SUCCESS IN CNS

Zkrácená informace o přípravku (nenahrazuje SPC).
Xeomin®
Název přípravku: Xeomin® 100 jednotek prášek pro injekční roztok. **Složení:** Jedna injekční lahvička obsahuje Toxinum botulinicum (incobotulinum) typus A (150 kD), bez komplexotvorných proteinů 100 jednotek. **Indikace:** U dospělých symptomatická léčba blefarospasmu a hemifaciálního spasmu, cervikální dystonie převážně rotační formy (torticollis spastica), spasticity horních končetin a chronické sialorey v důsledku neurologických poruch. U dětí a dospívajících ve věku od 2 do 17 let s hmotností ≥ 12 kg k symptomatické léčbě chronické sialorey v důsledku neurologických poruch / poruch nervového vývoje. **Dávkování a způsob podání:** jednotkové dávky nejsou pro přípravek Xeomin® zaměnitelné s jinými přípravky obsahujícími botulotoxin typu A. Přípravek smí podávat pouze lékaři s vhodnou kvalifikací a potřebnou zkušeností s aplikací botulotoxinu. Optimální dávku, frekvenci a počet míst vpichu určí lékař pacientovi individuálně. Nesmí být překročeny jednorázové individuální dávky. Při léčbě dětí a dospívajících se má používat ultrazvuková kontrola. Dětem a dospívajícím může být před injekcí nabídnuta lokální anestezie, sedace nebo anestezie v kombinaci se sedací. Pro každou indikaci a skupinu pacientů (dospělí, dospívající a děti) je dávkovací schéma, postup a lokalizace specifická a individuální, pro informace k dávkování a dávkovacím schématům je nutné číst plnou verzi SPC. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Generalizované poruchy svalové aktivity (např. myasthenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom). Infekce či zánět v navrhovaném místě aplikace. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Přípravek nesmí být podán do cévy. Před aplikací je nutné respektovat anatomická specifika pacienta. Opatrnost je nutná u pacientů s poruchou srážlivosti nebo léčenými antikoagulanci. Upozornění se týká lokálních účinků a vzdáleného šíření toxinu, které mohou mít souvislost s nežádoucími účinky a mohou být život ohrožující. Byly hlášeny i případy úmrtí, které byly v některých případech spojeny s dysfagií, pneumonií. Další upozornění se týkají: výskytu značné tělesné slabosti; dysfagie; nutné opatrnosti u některých onemocnění jako AMLS, neuromuskulární dysfunkce, svalové atrofie; hypersenzitivních reakcí; tvorby protilátek. Pro úplné informace a upozornění k jednotlivým indikacím viz plná verze SPC. **Interakce:** Nebyly provedeny žádné interakční studie. Účinek botulotoxinu může být teoreticky potencován aminoglykosidovými antibiotiky nebo jinými léčivými přípravky zasahujícími do nervosvalového přenosu. Periferní myorelaxancia. Radioterapie. Anticholinergika. **Těhotenství a kojení:** Přípravek v těhotenství má být používán pouze v případě, že potenciální přínos převáží rizika a užití během kojení není doporučeno. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Mírný až středně silný vliv. Pacienti mají být poučeni. **Nežádoucí účinky:** Suché oči, rozostřené vidění, porucha vidění, sucho v ústech, bolest v místě injekce, infekce horních cest dýchacích, bolesti hlavy, presynkopa, závrať, dysfagie, nauzea, hyperhidróza, bolest v krku, svalová slabost, myalgie, svalová křeč, muskuloskeletální ztuhlost, astenie, parestezie. **Doba použitelnosti:** 4 roky. **Uchovávání:** Při teplotě do 25 °C. **Balení a druh obalu:** Injekční lahvička (sklo třídy I) se zátkou (brombutylová pryž). **Velikost balení:** 1 injekční lahvička obsahující 100 jednotek. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstrase 100, 60318 Frankfurt/Main, P.O. Box 11 13 53, 60048 Frankfurt/Main, Německo. **Registrační číslo:** 63/138/14-C. **Datum registrace/prodloužení registrace:** 23.7.2014/1.6.2016. **Datum poslední revize textu:** 10. 2. 2022. **Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, výši a podmínky úhrady naleznete v aktuálním Seznamu léčiv a PZLU hrazených ze zdravotního pojištění na www.sukl.cz. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s podrobnými informacemi v platném Souhrnu údajů o přípravku.** Zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Desitin Pharma, spol. s r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, telefon: +420 222 245 375, email: desitin@desitin.cz

Datum přípravy: březen 2022

XEO/ALL/16:9/03/22

Nový **COMT inhibitor** s dávkováním **1× denně**

Plně hrazen zdravotními pojišťovnami – bez doplatku, pro vaše pacienty s Parkinsonovou nemocí

Zkrácené informace o léčivém přípravku

Název léčivého přípravku: Ongentys 25 mg tvrdé tobolky; Ongentys 50 mg tvrdé tobolky. **Složení:** Jedna tvrdá tobolka obsahuje opicaponum 25 mg (50 mg). **Terapeutické indikace:** Ongentys je indikován jako přídatná léčba k přípravkům obsahujícím kombinace levodopa/inhibitory DOPA-dekarboxylázy (DDCI) u dospělých pacientů s Parkinsonovou chorobous motorickými fluktuacemi na konci dávkovacího intervalu („end-of-dose" fluktuace), které nelze těmito kombinacemi stabilizovat. **Dávkování a způsob podání:** Dávkování: Doporučená dávka je 50 mg denně před spaním nejméně jednu hodinu před nebo po kombinacích levodopy. Způsob podání: Perorální podání. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. SPC. Feochromocytom, paragangliom nebo jiné novotvary vylučující katecholaminy. Neuroleptický maligní syndrom a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze. Souběžné užívání s jinými inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-B, např. fenelzin, tranylcypromin a moklobemid) než s těmi, které jsou určeny k léčbě Parkinsonovy choroby. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Ongentys se vždy podává jako přídatná léčba k léčbě levodopou. Upozornění platná pro léčbu levodopou je tedy třeba brát v úvahu i při léčbě přípravkem Ongentys. Opikapon posiluje účinky levodopy. Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo jinou dopaminergní léčbou, se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. Ve studiích s nitrokatecholovými inhibitory katechol-O-methyltransferázy (COMT) byly hlášeny nárůsty hodnot jaterních enzymů. Ongentys obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat. **Interakce:** Použití s jinými IMAO je kontraindikováno. Další interakce viz SPC. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté: dyskineze. Časté: abnormální sny, halucinace, vizuální halucinace, insomnie, závrať, bolest hlavy, somnolence, ortostatická hypotenze, zácpa, sucho v ústech, zvracení, svalové spasmy, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávejte v původním blistru/dobře uzavřené lahvičce k ochraně před vlhkostí. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Bial - Portela & C°, S.A., Á Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugalsko. **Registrační číslo(a):** EU/1/15/1066/001-010. **Datum revize textu:** 18. 2. 2021. **Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Tento léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.**
Dříve než předepíšete tento přípravek, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku, který je k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu nebo na adrese držitele rozhodnutí o registraci.

CZ-ONG-0323-001

Medis Pharma s.r.o., Národní 60/28, 110 00 Praha 1, www.medis.com

MEDIS Therapeutics

Bial parkinson's

Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která je doprovázena těžkými motorickými fluktuacemi a hyperkinezí nebo dyskinezí, pokud dostupné kombinace perorálních antiparkinsonik neposkytují uspokojivé výsledky.[1]

Kontinuální dopaminergní stimulace (CDS)[2]

Z klinických studií vyplývá, že **kontinuální podávání levodopy je fyziologičtější než intermitentní (perorální) podávání** a snižuje riziko motorických komplikací[2–4]

Reference: 1. Lecigimon Souhrn údajů o přípravku, poslední revize textu 8. 7. 2021 2. Olanow CW, et al. Mov Disord. 2020; Aug 20. doi: 10.1002/mds.28215; 3. Olanow CW, et al. Lancet Neurol. 2006;5(8):677–87.; 4. Schwartz M, Sabatay S. Isr Med Assoc J. 2012;14(3):175–9.

Zkrácená informace o přípravku: Lecigimon 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml intestinální gel
Indikační skupina: antiparkinsonika, dopa a její deriváty. **Složení:** 1 ml obsahuje levodopum 20 mg, carbidopum monohydricum 5 mg (odpovídá carbidopum anhydricum 4,6 mg) a entacaponum 20 mg. 47 ml (1 kazeta) obsahuje levodopum 940 mg, carbidopum monohydricum 235 mg a entacaponum 940 mg. **Indikace:** léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která reaguje na léčbu levodopou a je doprovázena těžkými motorickými fluktuacemi a hyperkinezí nebo dyskinezí, pokud dostupné kombinace perorálních antiparkinsonik neposkytují uspokojivé výsledky. **Dávkování a způsob užívání:** k intestinálnímu podání. Dávka má být titrována tak, aby se dosáhlo optimální klinické odpovědi pro konkrétního pacienta. Celková denní dávka přípravku Lecigimon je složena ze tří individuálně přizpůsobených dávek: *ranního bolusu, průběžné udržovací dávky a dalších bolusových dávek*. Lecigimon lze podávat až 24 hod/den, je-li takové podání lékařsky odůvodněno. Maximální doporučená denní dávka je 100 ml (což odpovídá 2000 mg levodopy, 500 mg monohydrátu karbidopy a 2000 mg entakaponu – viz SPC bod 4.4). *Ranní dávka:* je podávána pumpou pro rychlé dosažení terapeutické hladiny (během 30 minut). Dávka se upravuje v přírůstcích po 0,1 ml (2 mg). Celková ranní dávka je obvykle 5–10 ml, což odpovídá 100–200 mg levodopy a nemá přesáhnout 15 ml (300 mg levodopy). *Kontinuální udržovací dávka:* je podávána pumpou, aby byla udržována terapeutická hladina. Udržovací dávka se upravuje v přírůstcích po 2 mg za hodinu (0,1 ml/h) a je obvykle 0,7–5 ml za hodinu (15–100 mg levodopy za hodinu). Maximální doporučená denní dávka je 100 ml (2000 mg levodopy). *Další bolusové dávky a Titrace během převodu z kombinace levodopa/karbidopa na přípravek Lecigimon – viz SPC bod 4.3.* Lecigimon je gel pro kontinuální intestinální podání (podání do duodena nebo horního jejuna). Pro podávání přípravku smí být používána pouze pumpa Crono LECIG (CE 0476). Návod s instrukcemi pro používání přenosné pumpy je dodáván spolu s pumpou. Kazeta je určena pouze k jednorázovému použití a nesmí se používat déle než 24 hodin. Dávkovací pumpu s vloženou kazetou je možné nosit na těle až 16 hodin. Po otevření je možné kazetu používat i následující den, avšak nejdéle 24 hodin po prvním otevření. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1., glaukom s uzavřeným úhlem, těžké srdeční selhání, těžká srdeční arytmie, akutní cévní mozková příhoda, těžká porucha funkce jater, užívání neselektivních inhibitorů MAO a selektivních inhibitorů MAO typu A, feochromocytom, hypertyreóza, Cushingův syndrom, neuroleptický maligní syndrom (NMS) a/nebo netraumatická rhabdomyolýza, suspektní neurčené kožní léze nebo melanom v anamnéze. **Interakce:** při používání současně s následujícími léčivými přípravky je třeba opatrnosti: antihypertenziva, antidepresiva, anticholinergika, jiná antiparkinsonika, antagonisté dopaminových receptorů (některá antipsychotika, např. fenothiaziny, butyrofenony a risperidon, a antiemetika, např. metoklopramid), benzodiazepiny, isoniazid, fenytoin a papaverin mohou snižovat terapeutický účinek levodopy. **Hlavní nežádoucí účinky:** snížení tělesné hmotnosti, úzkost, deprese, insomnie, dyskineze, zhoršení Parkinsonovy choroby/zhoršení parkinsonismu, ortostatická hypotenze, nauzea, zácpa, průjem, bolest svalů a tkání a muskuloskeletální bolest, chromaturie. Nežádoucí účinky spojené se systémem k aplikaci a s jeho zavedením do organismu – viz SPC bod 4.8. **Upozornění:** Lecigimon se nedoporučuje k léčbě polékových extrapyramidových účinků. Lecigimon podávat s opatrností pacientům s ischemickou chorobou srdeční, s těžkým kardiovaskulárním nebo pulmonálním onemocněním, bronchiálním astmatem, renálním, hepatálním nebo endokrinním onemocněním nebo s anamnézou žaludeční vředové choroby nebo konvulzí. U všech pacientů má být pečlivě sledován rozvoj změn duševního stavu, deprese s tendencemi k sebevraždě a jiné závažné duševní změny. Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. Dopaminový dysregulační syndrom (DDS) je návyková porucha, která u některých pacientů léčených kombinací karbidopa/levodopa vede k nadměrnému užívání přípravku. **Těhotenství a kojení:** přípravek se nedoporučuje během těhotenství ani u žen ve fertilním věku nepoužívajících antikoncepci, pokud přínos pro matku nepřevažuje nad možnými riziky pro plod. V průběhu léčby přípravkem je třeba se vyvarovat kojení. **Balení na trhu:** 47 ml gelu v polypropylenové kazetě. Širší konec je opatřen pístovým uzávěrem z polyisoprenové pryže a otvor vývodu ENFit konektoru je opatřen uzávěrem z polypropylenu. Balení obsahuje 7 kazet. **Podmínky uchovávání:** uchovávejte v chladničce (2–8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Datum poslední revize textu:** 31. 1. 2023 **Držitel rozhodnutí o registraci:** LobSor Pharmaceuticals AB, Kålsängsgränd 10 D, SE-753 19 Uppsala, Švédsko. **Registrační číslo**: 27/480/20-C **Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplným souhrnem údajů o přípravku.**

STADA

Zastoupení v ČR:
STADA PHARMA CZ s.r.o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, tel.: +420 257 888 111, www.stada-pharma.cz

04/23

Poznámky:

Poznámky:

Diamantový partner

abbvie

Zlatý partner

MEDIS healthy values

STADA

Stříbrný partner

DESITIN
SUCCESS IN CNS

Vystavovatel

AOP HEALTH

cardion

Medtronic

Pharma Gen
EVER PHARMA

Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce