

Program




28. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

17. - 18. března 2023

Zámek Červený Hrádek 1, Jirkov

Partneři a vystavovatelé

Desitin Pharma, spol. s r.o.	1	DEYMED Diagnostic s.r.o.	3	Efsete s.r.o	6	Egis Praha spol. s r. o.	10	Medison Pharma s.r.o.	4	PHARMAGEN CZ, s.r.o.	8	Walter Graphtek CZ s.r.o.	5
------------------------------	---	--------------------------	---	--------------	---	--------------------------	----	-----------------------	---	----------------------	---	---------------------------	---



Pátek

17.03.2023

		06:00 7:00		8:00		9:00		10:00 11:00		12:00		13:00 14:00		15:00		16:00 17:00		18:00		19:00		20:00 21:00		22:00		23:00	
 Hlavní sál		Registrace účastníků a firem 08:00 - 12:00					Zahájení.. 09:30 - 09:40		Blok I 09:40 - 12:20					Blok II 13:20 - 15:00		Přestávka.. 15:00 - 15:20		Blok III (varia + kazuistiky) 15:20 - 16:50					Večeře 20:00 - 23:30				
 Restaurace									Oběd v restauraci (přízemí).. 12:20 - 13:20																		
		Registrace firem a účastníků		Hlavní sdělení		Ústní sdělení		Oběd		Večeře		Coffee Break															

Sobota

18.03.2023

[illegible]

Pátek

17.03.2023

📍 **Hlavní sál** Restaurace

08:00 - 12:00



REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM

📍 Hlavní sál | Registrace firem a účastníků

09:30 - 09:40



ZAHÁJENÍ

📍 Hlavní sál | Hlavní sdělení

09:40 - 12:20



BLOK I

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

DYSTROFICKÉ A NEDYSTROFICKÉ MYOTONIE

Mazanec R.

40 min

NEJČASTĚJŠÍ SVALOVÉ DYSTROFIE U DOSPĚLÝCH A CO JIM MŮŽEME NABÍDNOUT

Ridzoň P.

40 min

EMERY DREIFUSS DYSTROFIE , SOUBOR PACIENTŮ

Ehler E.

20 min

TOXICKÉ A POLÉKOVÉ MYOPATIE

Fiala J.

30 min

INTERNÍ KOMPLIKACE SVALOVÝCH DYSTROFIÍ

Junkeroval J.

30 min

Pátek

17.03.2023

📍 **Hlavní sál** Restaurace

13:20 - 15:00



BLOK II

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

TUMORY PROXIMÁLNÍHO N. FEMORALIS A N. ISCHIADICUS, UKÁZKA KAZUISTIK , EMG NÁLEZY
Humhej I.

60 min

SONOGRAFIE NERVŮ A NAVIGACE PŘI APLIKACI V PRAXI
Minks E.

40 min

15:00 - 15:20



PŘESTÁVKA NA KÁVU

📍 Hlavní sál | Coffee Break

15:20 - 16:50



BLOK III (VARIA + KAZUISTIKY)

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

LÉČBA CIDP, MMN
Ehler E.

20 min

ZAKROUCENÉ NERVY
Lachman H.

30 min

ROLE NEUROLOGA V HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI
Lipšová V.

40 min

JE TO V ŘITI....
Vaško P.

20 min

Pátek

17.03.2023

📍 **Hlavní sál**

Restaurace

20:00 - 23:30



VEČEŘE

📍 Hlavní sál | Večeře

Vstup pouze pro účastníky, kteří si večeři objednali během online registrace a mají uhrazený vstup.

Pátek

17.03.2023

Hlavní sál  Restaurace

12:20 - 13:20 

OBĚD V RESTAURACI (PŘÍZEMÍ)
 Restaurace | Oběd

Sobota

18.03.2023



Hlavní sál

Restaurace

Salonek

09:00 - 11:00



PRAKTICKÁ CVIČENÍ EMG - POD VEDENÍM DOC. MUDR. E. EHLERA A MUDR. P. RIDZONĚ

📍 Hlavní sál | Workshop

Sobota

18.03.2023

Hlavní sál

Restaurace



Salonek

09:00 - 11:00



SONOGRAFIE NERVŮ - POD VEDENÍM MUDR. E. MINKSE PH.D A MUDR. A. MINKSOVÉ

📍 Salonek | Workshop



JSEM EMMANUEL MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je opět
ovládat počítač
pravou rukou.



Emmanuel, 44 let
Pacient se spasticitou



JSEM VICTORIA MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je hledět
rovně před sebe
bez námahy.

Victoria, 75 let
Pacientka s cervikální dystonií



JSEM HELMUT MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je opět
povečřet
s přáteli.



Helmut, 79 let
Pacient se sialoreou



Jaké jsou cíle vašich pacientů? Posuňme terapii botulotoxinem na vyšší úroveň.



Zkrácená informace o přípravku (nenahrazuje SPC).

Xeomin®

Název přípravku: Xeomin® 100 jednotek prášek pro injekční roztok. **Složení:** jedna injekční lahvička obsahuje Toxinum botulinicum (incobotulinum) typus A (150 kD), bez komplexotvorných proteinů 100 jednotek. **Indikace:** U dospělých symptomatická léčba blefarospasmu a hemifaciálního spasmu, cervikální dystonie převážně rotační formy (torticollis spastica), spasticity horních končetin a chronické sialorey v důsledku neurologických poruch. U dětí a dospívajících ve věku od 2 do 17 let s hmotností > 12 kg k symptomatické léčbě chronické sialorey v důsledku neurologických poruch / poruch nervového vývoje. **Dávkování a způsob podání:** Jednotkové dávky nejsou pro přípravek Xeomin® zaměřitelné s jinými přípravky obsahujícími botulotoxin typu A. Přípravek smí podávat pouze lékař s vhodnou kvalifikací a potřebnou zkušeností s aplikací botulotoxinu. Optimální dávku, frekvenci a počet míst vpichu určí lékař pacientovi individuálně. Nesmí být překročeny jednorázové individuální dávky. Při léčbě dětí a dospívajících se má používat ultrazvuková kontrola. Dětem a dospívajícím může být před injekcí náhodně aplikována lokální anestetika v kombinaci se sedací. Pro každou aplikaci a skupinu pacientů (dospělí, dospívající a děti) je dále uveden schéma, postup a lokalizace specifická a individuální, pro informace k dávkování a dávkovacím schématickým je nutné číst přílohu verze SPC. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivo nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, generalizované poruchy svalové aktivity (např. myasthenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom), infekce v místě aplikace. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Přípravek nesmí být podán do cévy. Před aplikací je nutné respektovat anatomická specifika pacienta. Opatrnost je nutná u pacientů s poruchou srážlivosti nebo s léčebnými antikoagulanty. Upozornění se týká lokálních účinků a vzdáleného šíření toxinu, které mohou mít související nežádoucí účinky a mohou být život ohrožující. Byly hlášeny případy úmrtí, které byly v některých případech spojeny s dysfagií, pneumonií. Další upozornění se týkají výskytu značné tělesné slabosti, dysfagie, nutnosti opatrnosti u některých onemocnění jako AMLs, neuromuskulární dysfunkce, svalové atrofie, hypersenzitivních reakcí, tvorby protilátek. Pro úplné informace a upozornění k jednotlivým indikacím viz příloha verze SPC. **Interakce:** Nebyly provedeny žádné interakční studie. Účinek botulotoxinu může být teoreticky potencován amnoglykosidovými antibiotiky nebo jinými léčivými přípravky zasahujícími do nervosvalového přenosu. Periferní myorelaxancia, radioterapie, anticholinergika. **Těhotenství a kojení:** Přípravek v těhotenství má být používán pouze v případě, že potenciální přínos převládá nad rizikem a u dětí během kojení není doporučeno. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Mírný až středně silný vliv. Pacienti mají být poučeni. **Nežádoucí účinky:** Suché oči, rozostřené vidění, porucha vidění, suchost v ústech, bolest v místě injekce, infekce horních cest dýchacích, bolest hlavy, přepřekážka, závrť, chvění, nauzea, hyperhidróza, bolest v krku, svalová slabost, myalgie, svalová křeč, muskuloskeletální ztuhlost, astenie, parestezie. **Doba použitelnosti:** 4 roky. **Uchovávání:** Při teplotě do 25 °C. **Balení a druh obalu:** injekční lahvička (sklo třídy II) se zátkou (brombutylová pryž). **Velikost balení:** 1 injekční lahvička obsahující 100 jednotek. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt/Main, P.O. Box 11 13 53, 60048 Frankfurt/Main, Německo. **Registrační číslo:** 63/138/14-C. **Datum registrace/prodloužení registrace:** 23.7.2014/1.6.2016. **Datum poslední revize textu:** 10.2.2022. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, vyšší a podmínky úhrady naleznete v aktuálním Seznamu léčiv a PZLU hrazených ze zdravotního pojištění na www.zakl.cz. Před předepsáním léku se, prosím, seznáme s podrobnými informacemi v písemném Souhrnu údajů o přípravku. Zásadně držitel rozhodnutí o registraci: Desitin Pharma, spol. s r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, telefon: +420 222 245 375, email: desitin@desitin.cz

Datum přípravy: březen 2022

XEOMIN/16/903/22


Stříbrný partner



Bronzový partner



Vystavovatelé



Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce