

Program

Dětská neurologie v každodenní praxi 2023

Webinář Oddělení Dětské neurologie FTN

30. března 2023



DĚTSKÁ NEUROLOGIE V KAŽDODENNÍ PRAXI 2023

30. března 2023

Webinář Oddělení dětské neurologie FTN

Čtvrtek

30.03.2023

06:00		7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
📍 Online				Zlatá rybk.. 09:25 - 09:30	Odborný program 09:30 - 12:30		Symposium .. 12:30 - 13:00	Fenflurami.. 13:00 - 13:30										
	Ústní sdělení	Symposium																

Čtvrtek

30.03.2023

📍 Online

09:25 - 09:30



ZLATÁ RYBKA

📍 Online | Symposium

ZLATÁ RYBKA

Rybka Z.

09:30 - 12:30



ODBORNÝ PROGRAM

📍 Online | Ústní sdělení

STRATEGIE GENETICKÉHO VYSĚTRĚNÍ DEŤÍ S NEUROVYVOJOVÝMI PORUCHAMI

Šípek A.

30 min

VEŤKOVÉ VAŤZANE EPILEPTICKE SYNDROMY S DOBROU PROGNÓZOU

Bašovský M.

30 min

CĀSOVANA BOMBA? AKUTNĀ AREAKTIVNĀ JEDNOSTRANNA MYDRIAŤZA

Adamovičová M.

30 min

DEŤSKYĀ HYDROCEFALUS A JEHO LĚCĀBA

Hadač J., Homolková H.

40 min

SMA - CO JE NOVEĀHO?

Adamovičová M.

20 min

AADCĐ – LĚČITELNĀ NEUROTRANSMITEROVĀ PORUCHA

Ošlejšková H.

30 min

Čtvrtek

30.03.2023

📍 Online

12:30 - 13:00



SYMPOZIUM EISAI GESMBH, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

📍 Online | Symposium

LÉKOVÉ FORMY PROTIZÁCHVATOVÝCH LÉKŮ A JEJICH POUŽITÍ V DĚTSTVÍ

Ryzí M.

30 min

13:00 - 13:30



FENFLURAMIN - NOVÁ MOŽNOST V TERAPII FARMAKOREZISTENTNÍ EPILEPSIE U DĚTÍ (SYMPOZIUM UCB S.R.O.)

📍 Online | Symposium

FENFLURAMIN - NOVÁ MOŽNOST V TERAPII FARMAKOREZISTENTNÍ EPILEPSIE U DĚTÍ

Aulická Š.

 **SPINRAZA™**
(nusinersen) 12 mg solution
for injection



* Věk v době pořízení fotografie.

Camden
věk 4 roky*
presymptomatická SMA
lécen přípravkem SPINRAZA™ od roku 2015

**LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MODIFIKUJÍCÍ PRŮBĚH
ONEMOCNĚNÍ K LÉČBĚ OSOB SE SMA SCHVÁLENÝ
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY A VŠECHNY TYPY
SMA S PROKÁZANOU DLOUHODOBOU ÚČINNOSTÍ
A BEZPEČNOSTNÍM PROFILEM.**

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU SPINRAZA

Název přípravku: Spinraza 12 mg injekční roztok. **Složení:** Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje nusinersenum natrium, což odpovídá nusinersenum 12 mg. Úplný seznam pomocných látek je uveden v SPC. **Terapeutické indikace:** Přípravek Spinraza je indikován k léčbě spinální svalové atrofie vázané na dlouhé raménko 5. chromozomu. **Dávkování a způsob podání:** Léčbu přípravkem Spinraza má zahájit pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou spinální svalové atrofie. Doporučená dávka je 12 mg (5 ml) při jednom podání. Léčba přípravkem Spinraza má být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy 4 nasycovacími dávkami ve dnech 0, 14, 28 a 63. Udržovací dávka má být potom podávána jednou za 4 měsíce. Přípravek Spinraza je určen k intratekálnímu podání pomocí lumbální punkce. Léčbu má podávat zdravotnický pracovník se zkušenostmi s prováděním lumbální punkce. Přípravek Spinraza se podává prostřednictvím intratekální bolusové injekce po dobu 1 až 3 minut za použití spinální anestetické jehly. Injekce se nesmí podat do míst na kůži, která vykazují známky infekce či zánětu. Doporučuje se, aby se před podáním přípravku Spinraza odebral takový objem cerebrospinálního moku, který odpovídá objemu přípravku Spinraza, který má být aplikován. Při podání přípravku Spinraza může být zapotřebí sedace. Při přípravě roztoku přípravku Spinraza k intratekálnímu podání se musí použít aseptický postup. Pokud dojde ke zpoždění nebo vynechání nasycovací nebo udržovací dávky, má být přípravek Spinraza podáván podle schématu uvedeném v tabulce 1 v části 4.2 SPC. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění:** Lumbální punkce: V souvislosti s provedením lumbální punkce existuje nízký výskyt nežádoucích účinků (např. bolest hlavy, bolest zad, zvracení). Možné obtíže mohou nastat u velmi mladých pacientů a u pacientů se skoliózou. Pro usnadnění provedení intratekálního podání přípravku Spinraza lze podle uvážení lékaře zvážit použití ultrazvuku nebo jiných zobrazovacích technik. Trombocytopenie a koagulační abnormality: Po subkutánním nebo intravenózním podání jiných antisense oligonukleotidů byly pozorovány koagulační abnormality a trombocytopenie včetně akutní těžké trombocytopenie. Pokud je to klinicky indikováno, doporučuje se před podáním přípravku Spinraza provést laboratorní vyšetření trombocytů a koagulace. Renální toxicita: Po subkutánním nebo intravenózním podání jiných antisense oligonukleotidů byla pozorována renální toxicita. Pokud je to klinicky indikováno, doporučuje se provést vyšetření bílkovin v moči. Při přetrvávající zvýšené hladině bílkovin v moči se mají zvážit další vyšetření. Hydrocefalus: V období po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených nusinersenem hlášeny případy komunikujícího hydrocefalu bez souvislosti s meningitidou nebo krvácením. Některým pacientům byla implantována ventrikuloperitoneální drenáž (shunt). Přínosy a rizika léčby nusinersenem u pacientů s ventrikuloperitoneální drenáží nejsou v současnosti známy a pokračování v léčbě po tomto zákroku je nutné pečlivě zvážit. **Interakce s jinými léčivými přípravky:** Nebyly provedeny žádné studie interakcí. *In vitro* studie naznačily, že nusinersen není induktorem ani inhibítorem metabolismu zprostředkovaného CYP450. *In vitro* studie naznačují, že pravděpodobnost interakcí s nusinersenem kvůli kompetici o vazbu na plazmatické bílkoviny nebo kompetici s transportéry či kvůli inhibici transportérů je nízká. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Podávání nusinersenu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Není známo, zda se nusinersen/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání nusinersenu. Nejsou k dispozici žádné údaje o potenciálních účincích na fertilitu u člověka. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Nusinersen nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté: bolest hlavy, bolest zad, zvracení. Není známo: meningitida, hypersenzitivita, aseptická meningitida. U pacientů léčených přípravkem Spinraza za použití lumbální punkce byly zaznamenány závažné infekce, např. meningitida. Také byl hlášen výskyt komunikujícího hydrocefalu, aseptické meningitidy a hypersenzitivity (např. angioedém, kopřivka a vyrážka). Frekvence těchto účinků není známa. **Předávkování:** V případě předávkování je třeba poskytnout podpůrnou lékařskou péči, včetně konzultace se zdravotnickým pracovníkem a důkladného vyšetření klinického stavu pacienta. **Podmínky uchovávání:** Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Balení:** 5 ml injekční lahvička. Jedna injekční lahvička v krabičce. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Biogen Netherlands B.V., 1171 LP Badhoevedorp, Nizozemsko. **Reg. číslo:** EU/1/17/1188/001. **Způsob úhrady a výdeje:** Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZULP). **Datum revize textu:** 01/2022.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Před předepsáním léku se prosím seznáme s úplnou informací o přípravku.
Biogen (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráči 1683/127, 140 00 Praha 4, tel.: 255 706 200, fax: 255 706 229, www.biogen.com.cz

 **Biogen**

Biogen (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráči 1683/127, Praha 4, 140 00
tel.: +420 255 706 200, www.biogen.com.cz
Biogen-82588, únor 2023

Stříbrný partner



Bronzový partner



Vystavovatelé



Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce