

Program



ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE II 2023

7.-8. listopadu 2023

Vinařství U Kapličky, Zaječí

Záštita

Výbor České neurologické společnosti ČLS JEP

Pořadatel

Neurologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice v
Praze

Prezident kongresu



doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Organizátor

MH Consulting s.r.o
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
www.mhconsulting.cz



Partneři a vystavovatelé

Angelini Pharma Česká
republika s.r.o.

1

Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po naskenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficiální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po naskenování QR kódu níže:



07. 11. 2023

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
--	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ústní sdělení	Coffee Break	Oběd	Večeře	Registrace účastníků	Volno	Nezadáno
---------------	--------------	------	--------	----------------------	-------	----------

Středa

08. 11. 2023

[illegible]

Úterý

07. 11. 2023

 **Hlavní sál**  Občerstvení

08:00-08:30  **SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE STAŽENÍ ZDE**
 Hlavní sál | Nežadáno

09:30-10:00  **REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ**
 Hlavní sál | Registrace účastníků

10:00-11:30  **EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ I (PROF. MUDR. PETR KAŇOVSKÝ, CSC., FEAN)**
 Hlavní sál | Ústní sdělení

EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ I (PROF. MUDR. PETR KAŇOVSKÝ, CSC., FEAN)
Horna M.

11:45-12:30  **EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ II (DOC. MUDR. KATEŘINA MENŠÍKOVÁ, PH.D., FEAN)**
 Hlavní sál | Ústní sdělení

EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ II (DOC. MUDR. KATEŘINA MENŠÍKOVÁ, PH.D., FEAN)
Horna M.

14:00-15:30  **SPÁNEK A JEHO PORUCHY I (DOC. MUDR. JITKA BUŠKOVÁ, PH.D.)**
 Hlavní sál | Ústní sdělení

15:30-16:15  **SPÁNEK A JEHO PORUCHY II (DOC. MUDR. JITKA BUŠKOVÁ, PH.D.)**
 Hlavní sál | Ústní sdělení

SPÁNEK A JEHO PORUCHY I (DOC. MUDR. JITKA BUŠKOVÁ, PH.D.)
Horna M.

Úterý

07. 11. 2023

Hlavní sál  Občerstvení

09:30-10:00		UVÍTACÍ COFFEE BREAK  Občerstvení Coffee Break
11:30-11:45		PŘESTÁVKA  Občerstvení Volno
12:30-14:00		OBĚD (V RESTAURACI VYHLÍDKA)  Občerstvení Oběd
16:15-16:30		PŘESTÁVKA NA KÁVU  Občerstvení Coffee Break
19:00-23:00		VEČEŘE (VE VINÁRNĚ S MORAVSKÝM SKLEPEM)  Občerstvení Večeře

Středa

08. 11. 2023

📍 **Hlavní sál**

Občerstvení

09:00-10:30



ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ I (DOC. MUDR. DANA HORÁKOVÁ, PH.D.)

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ I (DOC. MUDR. DANA HORÁKOVÁ, PH.D.)

Horna M.

10:45-11:30



ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ II (DOC. MUDR. DANA HORÁKOVÁ, PH.D.)

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A PŘIDRUŽENÁ ONEMOCNĚNÍ II (DOC. MUDR. DANA HORÁKOVÁ, PH.D.)

Horna M.

11:30-12:15



SYTÉM PÉČE O NEUROLOGICKÉ PACIENTY V ČR (PROF. MUDR. PETR MARUSIČ, PH.D. A ČLENOVÉ VÝBORU ČNS ČLS JEP)

📍 Hlavní sál | Ústní sdělení

Středa

08. 11. 2023

Hlavní sál



Občerstvení

10:30-10:45



PŘESTÁVKA NA KÁVU
📍 Občerstvení | Coffee Break

12:15-13:15



OBĚD (V RESTAURACI RETROGRIL)
📍 Občerstvení | Oběd

ZESÍLENÁ OCHRANA

PROTI NEKONTROLOVANÝM
FOKÁLNÍM ZÁCHVATŮM¹

- **BEZPRECEDENTNÍ
ÚČINNOST**

Mimořádně vysoký podíl pacientů
s nekontrolovanými fokálními záchvaty
léčených ONTOZRY® dosahuje
bezzáchvatovosti.^{2,3,4}

ONTOZRY®
cenobamát



Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz

HARMONIAMENTIS

The Brain Health Hub

O krok dále na vaší odborné cestě

Přinášíme vám odborné aktuality z oblasti CNS



www.harmoniamentis.cz

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

▼ Ontozry 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg

S: Cenobamatum 12,5 mg v jedné tabletě, cenobamatum 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg v jedné potahované tabletě. **I:** Přídavná léčba fokálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých pacientů s epilepsií bez adekvátní kontroly navzdory předchozí léčbě nejméně 2 antiepileptiky. **KI:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Vrozený syndrom krátkého QT. **ZU:** Pacienti mají být sledováni s ohledem na známky sebevražedných myšlenek a chování a pokud se u nich objeví, mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc. Při zahájení podávání cenobamátu ve vyšších dávkách a při rychlém zvyšování dávek byla hlášena léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS), která může být život ohrožující nebo fatální. V okamžiku předepisování přípravku mají být pacienti poučeni o známkách a příznacích DRESS (např. horečka, vyrážka spojená s postižením dalších orgánových systémů, lymfadenopatie, abnormální jaterní testy a eozinofilie) a mají být pečlivě sledováni s ohledem na kožní reakce. Pokud se objeví známky a příznaky naznačující tyto reakce, cenobamát má být okamžitě vysazen a má být zvážena alternativní léčba. Při podávání cenobamátu bylo pozorováno zkrácení intervalu QTcF závislé na dávce. Lékaři mají postupovat s opatrností při předepisování cenobamátu v kombinaci s jinými léčivými přípravky, u kterých se ví, že zkracují interval QT. Cenobamát nesmí být používán u pacientů s vrozeným syndromem krátkého QT. Obsahuje laktózu. **NŮ:** Velmi časté ($\geq 1/10$): somnolence, únava, sedace a hypersomnie, závrať, vertigo, porucha rovnováhy, ataxie, porucha chůze a abnormální koordinace, bolest hlavy. Časté ($\geq 1/100$ až $< 1/10$): stav zmatenosti, podrážděnost, dysartrie, nystagmus, afázie, porucha paměti, diplopie, rozmazané vidění, zácpa, průjem, nauzea, zvracení, sucho v ústech, vyrážka, erytematózní vyrážka, vyrážka na kůži celého těla, makulózní vyrážka, makulopapulózní vyrážka, morbilliformní vyrážka, papulózní vyrážka, svědění vyrážka a zvýšení jaterních enzymů. **IT:** Současné užívání cenobamátu s jinými látkami tlumícími CNS (př. alkohol, barbituráty a benzodiazepiny) může zvyšovat riziko neurologických nežádoucích účinků. Při souběžném podávání cenobamátu s fenytoinem nebo fenobarbitem není nutná úprava dávky cenobamátu, na základě individuální odpovědi během titrace cenobamátu však může být nutné snížit dávku fenytoinu nebo fenobarbitálu. Při souběžném podávání cenobamátu a klobazamu není nutná úprava dávky cenobamátu, může být ale nutné snížit dávku klobazamu. Souběžné podávání cenobamátu s lamotriginem nemělo žádný vliv na expozici cenobamátu, ale vedlo k poklesům koncentrací lamotriginu v závislosti na dávce. Při souběžném podávání s lamotriginem může být zapotřebí vyšších dávek cenobamátu (200–400 mg/den) pro udržení účinnosti. Při souběžném podávání cenobamátu s karbamazepinem, kyselinou valproovou, lakosamidem, levetiracetamem nebo oxkarbazepinem nejsou nutné úpravy dávkování. Cenobamát vykazoval na dávce závislou indukci CYP3A4 a snížení expozice (AUC) substrátu CYP3A4 u zdravých subjektů. Může být proto snížena účinnost hormonální antikoncepce při souběžném podávání s cenobamátem. Při souběžném podávání s cenobamátem může být nutné zvýšit dávky léků metabolizovaných pomocí CYP3A4 (př. midazolam). Při souběžném podávání s cenobamátem může být nutné zvýšit dávky léků metabolizovaných pomocí CYP2B6 (př. bupropion). Při souběžném podávání s cenobamátem může být nutné snížit dávky léků metabolizovaných pomocí CYP2C19 (př. omeprazol). Cenobamát inhibuje transportér OAT3 zapojený do eliminace např. baricitinibu, cefakloru, empagliflozinu, penicilinu G, ritobegronu a sitagliptinu. Proto může souběžné podávání cenobamátu a léčivých přípravků transportovaných OAT3 vést k vyšší expozici těmito léčivými přípravky. **TL:** Podávání cenobamátu se u žen, které mohou otěhotnět a nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje. Ontozry lze v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu cenobamátem. Ženy, které mohou otěhotnět, mají používat účinné antikoncepční metody během léčby cenobamátem a ještě 4 týdny po ukončení léčby. Kojení má být během léčby přípravkem Ontozry přerušeno. **D:** Doporučená počáteční dávka cenobamátu je 12,5 mg denně, s postupnou titrací na doporučenou cílovou dávku 200 mg denně. Na základě klinické odpovědi může být dávka zvýšena na maximálně 400 mg denně. Doporučené titrační schéma je 12,5 mg 1. a 2. týden, 25 mg 3. a 4. týden, 50 mg 5. a 6. týden, 100 mg 7. a 8. týden, 150 mg 9. a 10. týden, cílová dávka 200 mg 11. a 12. týden. V případě nedosažení optimální kontroly záchvatů lze zvyšovat dávku nad 200 mg v krocích po 50 mg/den každé dva týdny až do maximální denní dávky 400 mg. **DRR:** Angelini Pharma S.p.A., Viale Amelia 70, 00181, Rome – Itálie. **Reg.č.:** Ontozry 12,5mg+25mg: EU/1/21/1530/001, Ontozry 50 mg: EU/1/21/1530/003, Ontozry 100 mg: EU/1/21/1530/006, Ontozry 150 mg: EU/1/21/1530/009, Ontozry 200 mg: EU/1/21/1530/012. **Uchovávání:** Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. **Datum poslední revize textu SPC:** 27. 6. 2023. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen zdravotními pojišťovnami. Seznamte se, prosím, se Souhrnem údajů o přípravku (SPC).

Reference:

1. Aktuální SPC přípravku ONTOZRY. 2. Specchio N et al. Int J Mol Sci 2021; 22(17): 9339. 3. Krauss GL et al. Lancet Neurol. 2020;19(1):38–48 [incl. Supplementary Appendix]. 4. Halford JJ, Edwards JC. Acta Neurol Scand. 2020 Aug;142(2):91–107.



Angelini Pharma Česká republika s.r.o.,
Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, www.angelinipharma.cz

Zlatý partner



NICHE
PARFUME

Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce