


Program



XXXI. BRNĚNSKÝ DEN PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ - VIK (VŠEOBECNÁ INTERNÍ KLINIKA) DAY

11. října 2024

COURTYARD BY MARRIOTT, BRNO

Pořadatel

FN Brno a LF MU v Brně ve spolupráci s MH Consulting s.r.o.

Prezident kongresu



prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.


Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
www.mhconsulting.cz



Partneři a vystavovatelé

Abbott Laboratories s.r.o. 13	Amgen s.r.o. 7	Ardeapharma a.s. 10	AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 15	BAYER s.r.o. 19	Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. 11	Boehringer Ingelheim spol. s.r.o. 5	Danone a.s. 1
Electric Medical Service, s.r.o. 21	Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. 2	Herbacos Recordati s.r.o. 8	Kardio-Line spol. s r.o. 16	Merck spol. s r.o. 3	Neuris, s.r.o. 12	Novo Nordisk s.r.o. 6	Nutricia a.s. 4
PRO.MED.CS Praha a.s. 18	Sanofi s.r.o. 9	Swixx Biopharma s.r.o. 14	ZENTIVA, k.s. 17				



Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po naskenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po naskenování QR kódu níže:



11. 10. 2024

11. 10. 2024

Ústní sdělení	Hlavní sdělení	Workshop	Coffee Break	Svačina	Symposium	Registrace firem	Registrace firem a účastníků
---------------	----------------	----------	--------------	---------	-----------	------------------	------------------------------

Pátek

11. 10. 2024

 **Aurum** Argentum 1 Foyer Občerstvení

12:30-12:40



ZAHÁJENÍ
📍 Aurum 1. patro | Ústní sdělení

Ludka, Fernandová (Brno)

12:40-13:00



ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA - NOVINKY VPL
📍 Aurum 1. patro | Hlavní sdělení

Býma (Hradec Králové)

13:00-14:00



I. BLOK - PALIATIVNÍ PÉČE A ANTIBIOTICKÁ TERAPIE
📍 Aurum 1. patro | Ústní sdělení
E. Fernandová, A. Peroutková

13:00 - 13:20 Paliativní péče v ordinaci PL – Slámová (Brno)
13:30 - 13:50 Racionální ATB terapie v ordinaci PL – Horváthová (Brno)

14:30-16:00



II. BLOK - NOVÉ SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ORDINACI VPL
📍 Aurum 1. patro | Ústní sdělení
O. Ludka, L. Dvořáková

14:30 - 14:50 Screening Osteoporózy – Greplová (Brno)
15:00 - 15:20 Screening Ca Plic – Turčáni (Brno)
15:30 - 15:50 Screening Ca Prostaty – Trinh (Brno)

Pátek

11. 10. 2024

📍 **Aurum** Argentum 1 Foyer Občerstvení

16:00-16:20



RACIONALIZACE ANTISEKREČNÍ LÉČBY Z POHLEDU NOVELIZACE DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE 2024 (PRO.MED.CS)

📍 Aurum 1. patro | Symposium
O. Ludka

Kroupa (Brno)

16:30-18:00



IIII. BLOK - EKONOMIKA A VYKAZOVÁNÍ V ORDINACI VPL

📍 Aurum 1. patro | Ústní sdělení
L. Rausová, V. Marek

16:30 - 17:00 Ekonomika praxe – Košumberský

17:15 - 17:45 Vykazování v ordinaci aneb co se spolu nevykazuje - Maškulík

Pátek

11. 10. 2024

Aurum



Argentum 1

Foyer

Občerstvení

12:30-18:00



**WORKSHOP POCUS (POINT OF CARE ULTRASONOGRAPHY - VYUŽITÍ ULTRAZVUKU V MÍSTĚ PÉČE ZA ÚČELEM
OKAMŽITÉHO ROZHODOVÁNÍ O PÉČI O PACIENTA)**

📍 Argentum 1 1. patro | Workshop

Možnost vyzkoušet si UZ přímo na místě
Koudelka, Lokaj, Lekeš (Brno)

Pátek

11. 10. 2024

Aurum Argentum 1  **Foyer** Občerstvení

07:00-11:00		MONTÁŽ STÁNKŮ  Foyer 1. patro Registrace firem
11:30-15:00		REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ  Foyer 1. patro Registrace firem a účastníků
19:00-20:00		DEMONTÁŽ STÁNKŮ  Foyer 1. patro Registrace firem

Pátek

11. 10. 2024

Aurum Argentum 1 Foyer  **Občerstvení**

14:00-14:30



COFFEE BREAK
 Občerstvení | Coffee Break

18:00-19:00



VEČERNÍ OBČERSTVENÍ
 Občerstvení | Svačina



Snížení LDL-C přípravkem Repatha® je rychlé*, přetrvává po celou dobu léčby a redukuje KV riziko u pacientů v sekundární prevenci včetně těch, kteří nedávno prodělali IM a užívají maximální tolerovanou dávku statinů a případně ezetimibu.¹⁻³

* Snížení LDL-C o přibližně 55-75% bylo při léčbě evolokumabem dosaženo již v 1. týdnu a během dlouhodobé léčby přetrvávalo.²

Reference: 1. Sabatine MS, et al.; Circulation. 2018;138:756-66. 2. SPC Repatha březen 2023. 3. Giugliano RP, et al. Lancet. 2017;390:1962-71.

Zkrácené informace o léčivém přípravku REPATHA

Název léčivého přípravku: Repatha 140 mg injekční roztok v předplněném peru. **Kvalitativní a kvantitativní složení:** Jedno předplněné pero obsahuje evolokumabum 140 mg v 1 ml roztoku. **Léková forma:** Injekční roztok (injekce) v předplněném peru (SureClick). **Terapeutické indikace:** Primární hypercholesterolemie (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšená dyslipidemie u dospělých a heterozygotní familiární hypercholesterolemie u pediatrických pacientů ve věku 10 let a starších jako přídavek k dietě, a to: 1. v kombinaci se statinem nebo statinem a s dalšími hypolipidemiky u pacientů, u kterých není dosaženo cílových hladin LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo 2. v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován. Homozygotní familiární hypercholesterolemie v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 10 let a starších. Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění u dospělých ke snížení kardiovaskulárního rizika, a to 1. v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu s dalšími hypolipidemiky nebo bez nich, nebo 2. v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován. **Dávkování a způsob podání:** Podává se subkutánně do břicha, stehna nebo do horní oblasti paže. **Primární hypercholesterolemie a smíšená dyslipidemie (včetně heterozygotní familiární hypercholesterolemie) dospělí a pediatrické pacienti (ve věku 10 let a starší):** Prokázané aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění u dospělých. Doporučená dávka je 140 mg 1x za dva týdny nebo 420 mg 1x měsíčně. Obě dávky jsou klinicky ekvivalentní. Homozygotní familiární hypercholesterolemie u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 10 let a starších. Úvodní doporučená dávka je 420 mg 1x měsíčně. Pokud nebylo po 12 týdnech dosaženo klinicky významné odpovědi na léčbu, frekvenci dávek je možné zvýšit na 420 mg 1x za 2 týdny. Pacienti na aferéze mohou zahájit léčbu dávkou 420 mg 1x za 2 týdny, aby toto schéma odpovídalo cyklu aferézy. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Sledovatelnost. Má se přehledně zaznamenat název podaného léčivého přípravku a číslo šarže. **Porucha funkce jater:** Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C) nebyli studováni a evolokumab se má používat s opatrností. Suchý přírodní kaučuk. Kryt skleněné předplněné injekční stříkačky je vyroben ze suchého přírodního kaučuku (derivát latexu), který může vyvolávat závažné alergické reakce. **Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:** Nebyly provedeny žádné studie interakcí. V klinických studiích byla hodnocena farmakokinetická interakce mezi statiny a evolokumabem. Při použití kombinace statinu a evolokumabu není nutná úprava dávky statinu. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Údaje o podávání těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. V těhotenství lze použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu evolokumabem. Není známo, zda se evolokumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojení novorozence/kojení nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Repatha. Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu evolokumabu na fertilitu u člověka. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky při podávání doporučených dávek jsou nasopharyngitida (7,4 %), infekce horních cest dýchacích (4,6 %), bolest zad (4,4 %), artralgie (3,9 %), chřipka (3,2 %) a reakce v místě vpichu injekce (2,2 %). **Zvláštní opatření při uchovávání:** Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Důležité rozhodnutí o registraci:** Amgen Europe B.V., Minervum 706 1, 4817 ZK Breda, Nizozemsko. **Registrační číslo:** EU/1/15/1016/003. **Datum revize textu:** 30. března 2023.

Před předepsáním přípravku se, prosím, seznáme s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie u pacientů adherujících k dietnímu opatření.

URČENO PRO ODBORNOU VĚŘEJNOST

Amgen s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, tel.: +420 221 773 500, www.amgen.cz
SC-CZ-AMG145-00608
CZE-145-0924-80001


AMGEN

AMGEN

Edukace



www.amgen-edukace.cz



- ✓ Záznamy z odborných seminářů a sympozií
- ✓ Informace o úhradách a indikacích léčivých přípravků společnosti Amgen
- ✓ Pozvánky na odborné akce
- ✓ Edukační brožury pro pacienty

URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
Amgen s.r.o., Pod dráhou 1637/2, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 221 773 500, www.amgen.cz



CZE-NP-0424-80003

Zkrácená informace o léčivém přípravku Saxenda® 6 mg/ml injekční roztok v předplněném peru

Složení: 1 ml roztoku obsahuje 6 mg liraglutidu. Jedno předplněné pero obsahuje 18 mg liraglutidu ve 3 ml.
Indikace: Dospělí: doplňková léčba k dietě se sníženým obsahem kalorií a zvýšené fyzické aktivitě za účelem úpravy hmotnosti u dospělých pacientů s počáteční hodnotou indexu tělesné hmotnosti BMI ≥ 30 kg/m² (obezita) nebo BMI ≥ 27 kg/m² až < 30 kg/m² (nadváha) za přítomnosti alespoň jedné komorbiditidy související s hmotností, např. s dysglykemií, hypertenzí, dyslipidemií nebo obstrukční spánkovou apnoí. Dospívající (≥ 12 let): doplňková léčba ke zdravé výživě a zvýšené fyzické aktivitě k úpravě tělesné hmotnosti u dospívajících pacientů ve věku od 12 let s obezitou (BMI odpovídající ≥ 30 kg/m² u dospělých podle mezinárodních hraničních hodnot) a tělesnou hmotností nad 60 kg. **Dávkování a způsob podání:** Dospělí: počáteční dávka 0,6 mg jednou denně. Dávka má být zvýšena na 3,0 mg jednou denně v průběhu po 0,6 mg v nejméně jednotlivých intervalech, aby se zlepšila gastrointestinální snášenlivost. Pokud není navýšení na vyšší dávku během dvou po sobě jdoucích týdnů dobře snášeno, zvažte ukončení léčby. Denní dávky vyšší než 3,0 mg se nedoporučují. Dospívající (≥ 12 let až < 18 let): je třeba použít podobný postup navyšování dávky jako u dospělých. Zmeškané dávky: pokud dojde k vynechání dávky do 12 hod. od obvyklé doby podání, má si ji pacient aplikovat co nejdříve. Pokud do další dávky zbývá méně než 12 hod., pacient si nemá vynechanou dávku aplikovat a musí pokračovat v režimu podávání jednou denně další obvyklou dávkou. Pacient si nesmí vzít dávku navíc ani dávku zvýšit, aby vynechanou dávku nahradil. Přípravek Saxenda® je určen pouze pro subkutánní podání. Nesmí být podán intravenózně nebo intramuskulárně. Podává se jedenkrát denně kdykoli v průběhu dne, nezávisle na jídle. Aplikuje se injekčně do břicha, stehna nebo horní části paže. Pacienti s onemocněním diabetes mellitus 2. typu: Saxenda® se nemá používat v kombinaci s jinými agonisty GLP-1 receptoru. Při zahájení podávání přípravku Saxenda® zvažte snížení dávky souběžně podávaného inzulínu nebo sekretagogu inzulínu (např. sulfonylurey), aby se snížilo riziko hypoglykemie. K úpravě dávky inzulínu nebo sekretagogu inzulínu je nutné monitorování glykemie pacientem. **Zvláštní skupiny pacientů:** Starší pacienti (≥ 65 let): z důvodu věku není nutná žádná úprava dávkování. Zkušenosti s léčbou pacientů ve věku ≥ 75 let jsou omezené a použití u těchto pacientů se nedoporučuje. Porucha funkce ledvin: u pacientů s lehkou či středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ≥ 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávkování. Přípravek Saxenda® není doporučen pro použití u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ≤ 30 ml/min) včetně pacientů v konečném stadiu selhání ledvin. Porucha funkce jater: u pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater není doporučena žádná úprava dávkování. Saxenda® se nedoporučuje používat u pacientů s těžkou poruchou funkce jater a u pacientů s lehkou či středně těžkou poruchou funkce jater se musí používat s opatrností. Pediatrická populace: U dospívajících ve věku od 12 let není nutná žádná úprava dávky. Bezpečnost a účinnost přípravku Saxenda® u dětí mladších 12 let nebyla stanovena. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na liraglutid nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění:** u pacientů s onemocněním diabetes mellitus se nesmí Saxenda® používat jako náhrada za inzulín. U pacientů se závislostí na podávání inzulínu byla po rychlém vysazení nebo snížení dávky inzulínu hlášena diabetická ketoacidóza. U pacientů ve věku 75 let nebo výše, léčených dalšími přípravky k úpravě hmotnosti, se sekundární obezitou při endokrinních onemocněních, dříve při poruchách příjmu potravy nebo u pacientů léčených přípravky, které mohou způsobovat nárůst tělesné hmotnosti, s těžkou poruchou funkce ledvin, s těžkou poruchou funkce jater, s městnavým srdečním selháním třídy IV podle NYHA a se závažným onemocněním střev a diabetickou gastroparézou se použití nedoporučuje. Pankreatitida, cholelitiáza a cholelitiáza, onemocnění štítné žlázy, srdeční frekvence, dehydratace a hypoglykemie viz SPC. Pediatrická populace: U dospívajících (≥ 12 let) léčených liraglutidem byly hlášeny epizody klinicky významné hypoglykemie. Pacienti mají být informováni o charakteristických příznacích hypoglykemie a příslušných opatřeních. **Významné interakce:** malé zpoždění ve vyprazdňování žaludku při používání liraglutidu může ovlivnit absorpci současně podávaných perorálních léčivých přípravků. Saxenda® se nesmí míst s jinými injekčními přípravky (např. inzulíny), Warfarin a další deriváty kumarinu, paracetamol, atorvastatin, griseofulvin, digoxin, lisinopril a perorální antikoncepční přípravky viz SPC. Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. **Těhotenství a kojení:** liraglutid se nemá v těhotenství a během kojení užívat. Pokud si pacientka přeje otěhotnět nebo otěhotní, má být léčba liraglutidem přerušena. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou gastrointestinální poruchy (velmi časté: nauzea, zvracení, průjem, zácpa; méně časté: pankreatitida, zpoždění vyprazdňování žaludku). Další nežádoucí účinky: bolest hlavy, vyrážka, *intestinální obstrukce*. Více viz SPC. **Předávkování:** Hlášené příhody zahrnovaly těžkou nauzeu, těžké zvracení a těžkou hypoglykemií. **Balení:** zásobní vložka obsahující v jednorázovém předplněném vícedávkovém peru jedno pero obsahuje 3 ml roztoku a lze jej použít k aplikaci dávky 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg a 3,0 mg. Velikost balení 3 předplněná pera. **Doba použitelnosti:** 30 měsíců. Po prvním použití 1 měsíc. **Uchovávání:** Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chráňte před mrazem. Neuchovávejte v blízkosti mrazáčního oddílu. Po prvním použití uchovávejte při teplotě do 30 °C nebo v chladničce (2 °C – 8 °C). Ponechávejte uzavřená pera, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Způsob výdeje:** výdej vázán na lékařský předpis. **Způsob hrazení:** přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. **Datum schválení:** 23. března 2015. **Datum revize textu:** 07/2024. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dánsko. **Reg. číslo:** EU/1/15/992/002. **Další informace získáte z SPC, příbalové informace nebo na adrese firmy Novo Nordisk:** Novo Nordisk s.r.o., Karolínská 706/3, 186 00, Praha 8 – Karlín.

*Všimněte si prosím změny v informacích o léčivém přípravku

Reference: 1. SPC přípravku Saxenda®. 2. Pi-Sunyer X et al. N Engl J Med. 2015 Jul 2;373(1):11-22. 3. Le Roux CW et al. Lancet. 2017 Apr 8;389(10077):1399-1409. 4. Marso P et al. N Engl J Med. 2016 Jul 28;375(4):311-22. 5. Ostádal P et al. Cor Vasa 2022; 64 (Suppl. 1):7-23. 6. Müllerová D a kol. Prakt. Léč. 2021; 101(1): 32-47. 7. Trensón L et al. Obes Facts. 2022;15(1):83-89. 8. Schultes B et al. Diabetes Obes Metab. 2024 Mar;26(3):1023-1032. 9. Kolotkin RL et al. Clin Obes. 2018 Feb;8(1):1-10. 10. Knudsen LB and Lau J. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Apr 12;10:155.

Saxenda®

liraglutid injekce

Důvod na každý den

Proč Saxenda® může být i **Vaší první volbou** v léčbě nadváhy a obezity

- 1 Kila jdou dolů^{1,3}
- 2 Flexibilita každý den¹
- 3 Zasahuje více cílů najednou^{1,3}
- 4 S důvěrou v srdci^{1,4}
- 5 Originální molekula^{1,1,3}
- 6 Účinnost s důvěrou v bezpečnost^{1,5}
- 7 Kvalita života jde nahoru^{1,2,9}



Pacienti s nadváhou jsou pacienti, kteří mají BMI ≥ 27 kg/m² až < 30 kg/m² (nadváha) za přítomnosti alespoň jedné komorbiditidy související s hmotností, např. s dysglykemií, (prediabetes nebo diabetes mellitus 2. typu), hypertenzí, dyslipidemií nebo obstrukční spánkovou apnoí.

C2245X00110



Již od 12 let¹



Hledáme
zázraky vědy,
abychom
zlepšili
životy lidí.

sanofi

Platinový partner



Zlatý partner



Stříbrný partner



Bronzový partner



Vystavovatel



Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce