Program



XXV. ROČNÍK KURSU KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ

25.-26. května 2026

Hotel Dvořák, Tábor

Záštita

Centrum extrapyramidových onemocnění (EXPY)

Pořadatel

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s MH Consulting s.r.o.

Prezident kongresu




doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10
www.mhconsulting.cz

Partneři a vystavovatelé

AbbVie s.r.o. 1	CARDION s.r.o. 6	Desitin Pharma, spol. s r.o. 3	MagnaPharm CZ, s.r.o. 4	Medis Pharma s.r.o. 2	Medtronic Czechia s.r.o. 11	Orion Pharma s.r.o. 7	STADA PHARMA CZ s.r.o. 5



Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po nascenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po nascenování QR kódu níže:

Neděle

24. 05. 2026

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Foyer													Montáž stánků 18:00 - 21:00					
Občerstvení														Večeře pro přednášející a výbor 18:30 - 22:00				

Registrace firem | Večeře

Pondělí

25. 05. 2026



Úterý

26. 05. 2026



Neděle

24. 05. 2026

Foyer | Občerstvení

18:00-21:00

MONTÁŽ STÁNKŮ
Foyer | Registrace firem

Neděle

24. 05. 2026

Foyer | Občerstvení

18:30-22:00

VEČEŘE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ A VÝBOR
Občerstvení | Večeře

Restaurace La Cave

Pondělí

25. 05. 2026

Hlavní sál | Konferenční salonek | Občerstvení | Registration desk

08:30-08:40

ZAHÁJENÍ KURZU
Hlavní sál | Jiné

ZAHÁJENÍ — 10 min
H. Brožová

08:40-10:30

BLOK I
Hlavní sál | Ústní sdělení

EPIDEMIOLOGIE PARKINSONOVY NEMOCI — 20 min
R. Jech

DIAGNOSTIKA A ZAHÁJENÍ LÉČBY PARKINSONOVY NEMOCI — 30 min
H. Brožová

KDY (NE)POSLAT PACIENTA S PARKINSONOVOU NEMOCÍ DO CENTRA — 30 min
P. Dušek

INTERVENČNÍ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ PARKINSONOVY NEMOCI — 30 min
R. Jech

11:30-11:50

LÉČBA STŘEDNÍHO STADIA PARKINSONOVY NEMOCI U MLADŠÍCH PACIENTŮ. (SYMPOZIUM ABBVIE S.R.O.)
Hlavní sál | Symposium

LÉČBA STŘEDNÍHO STÁDIA PARKINSONOVY NEMOCI U MLADŠÍCH PACIENTŮ — 20 min
P. Havránková

Pondělí

25. 05. 2026

Hlavní sál | Konferenční salonek | Občerstvení | Registration desk

13:30-15:00

BLOK II
Hlavní sál | Ústní sdělení

ORGANICKÝ TŘES 30 min
E. Růžička

FUNKČNÍ TŘES 30 min
T. Serranová

LÉČBA TŘESU 30 min
O. Ulmanová

15:30-16:45

WORKSHOP APLIKACE BTX PRO OBLIČEJOVÉ DYSTONIE
Hlavní sál | Workshop

APLIKACE BTX PRO OBLIČEJOVÉ DYSTONIE 75 min
P. Havránková

16:45-18:00

WORKSHOP EXPLORACE A MANAGEMENT PSYCHICKÝCH SYMPTOMŮ U EXPY PACIENTŮ V ORDINACI NEUROLOGA
Hlavní sál | Workshop

EXPLORACE A MANAGEMENT PSYCHICKÝCH SYMPTOMŮ U EXPY PACIENTŮ V ORDINACI NEUROLOGA 75 min
T. Uhrová

Pondělí

25. 05. 2026

Hlavní sál | Konferenční salonek | Občerstvení | Registration desk

15:30-16:45

WORKSHOP VYŠETŘENÍ FUNKČNÍ PORUCHY HYBNOSTI

Konferenční salonek -1.patro | Workshop

VYŠETŘENÍ FUNKČNÍ PORUCHY HYBNOSTI 75 min
T. Serranová

16:45-18:00

WORKSHOP RADIOLOGICKÉ NÁLEZY U EXPY ONEMOCNĚNÍ

Konferenční salonek -1.patro | Workshop

RADIOLOGICKÉ NÁLEZY U EXPY ONEMOCNĚNÍ 75 min
P. Dušek

Pondělí

25. 05. 2026

Hlavní sál | Konferenční salonek | **Občerstvení** | Registration desk

10:30-11:00

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Občerstvení | Coffee Break

11:50-13:30

OBĚD V RESTAURACI LA CAVE
Občerstvení | Oběd

15:00-15:30

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Občerstvení | Coffee Break

19:00-23:00

VEČEŘE V RESTAURACI LA CAVE
Občerstvení | Večeře

Pondělí

25. 05. 2026

Hlavní sál | Konferenční salonek | Občerstvení | Registration desk

08:00-17:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM

Registration desk | Registrace firem a účastníků

Úterý

26. 05. 2026

Hlavní sál | Občerstvení | Registration desk

08:30-10:00 — **BLOK III**
Hlavní sál | Ústní sdělení

- **AKUTNÍ DYSKINETICKÁ ONEMOCNĚNÍ** — 30 min
  J. Klempíř
- **TARDIVNÍ DYSKINEZE** — 30 min
  T. Uhrová
- **STEREOTYPIE** — 30 min
  J. Roth

10:30-12:00 — **KAZUISTICKÝ BLOK**
Hlavní sál | Ústní sdělení

12:00-12:15 — **UKONČENÍ SJEZDU**
Hlavní sál | Jiné

Úterý

26. 05. 2026

Hlavní sál | **Občerstvení** | Registration desk

10:00-10:30

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Občerstvení | Coffee Break

12:15-13:55

OBĚD V RESTAURACI LA CAVE
Občerstvení | Oběd

Úterý

26. 05. 2026

Hlavní sál | Občerstvení | Registration desk

08:00-10:30

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM

Registration desk | Registrace firem a účastníků



Zkrácené informace o léčivém přípravku

Název: Duodopa SC 240 mg/ml + 12 mg/ml infuzní roztok. Složení: Jeden ml obsahuje 240 mg foslevodopy a 12 mg foskarbidopy. **Indikace:** Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která reaguje na léčbu levodopou a je doprovázena těžkými motorickými fluktuacemi a hyperkinezí nebo dyskinezí, pokud dostupné kombinace antiparkinsonik neposkytují uspokojivé výsledky. **Dávkování:** Duodopa SC se podává jako kontinuální subkutánní infuze, 24 hodin denně. Doporučená počáteční rychlost infuze přípravku Duodopa SC se stanoví přepočtem denního příjmu levodopy na ekvivalenty levodopy (LE) pomocí příslušných koeficientů násobících dávku (pro výpočet se bere v úvahu pouze levodopa a inhibitory COMT) a následným výpočtem zohledňujícím vyšší biologickou dostupnost subkutánní foslevodopy, poměr molekulových hmotností foslevodopy a levodopy, obsah foslevodopy v 1 ml a počet hodin bdělosti použitý pro stanovení LE. Dávku lze upravit tak, aby bylo dosaženo klinické odpovědi, která maximalizuje funkční „on" periodu a minimalizuje počet a trvání „off" period a „on" period s obtěžující dyskinezí. Maximální doporučená denní dávka foslevodopy je 6 000 mg (nebo 25 ml přípravku Duodopa SC denně, což odpovídá přibližně 4 260 mg levodopy denně). K ***zahájení*** léčby přípravkem Duodopa SC je také potřebné určit objem nasycovací dávky. Pumpa umožňuje naprogramovat 2 ***alternativní rychlosti*** infuze pro pacienta (nízká/vysoká). Pokud to zdravotnický pracovník umožní, mohou si pacienti sami podat ***extra dávku*** ke zvládnutí akutních „off" příznaků, které se objeví během kontinuální infuze. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku, glaukom s uzavřeným úhlem, těžké srdeční selhání, akutní cévní mozková příhoda, těžká srdeční arytmie, současné užití neselektivních inhibitorů MAO a selektivních inhibitorů MAO typu A (jejich podávání musí být přerušeno min. dva týdny před zahájením léčby přípravkem Duodopa SC), stavy, za kterých jsou kontraindikovány látky s adrenergním účinkem, např. feochromocytom, hyperthyreoidismus a Cushingův syndrom. Jelikož levodopa může aktivovat rozvoj maligního melanomu, nesmí být přípravek Duodopa SC používán u pacientů s podezřelou neurčenou kožní lézí nebo s melanomem v anamnéze. **Zvláštní upozornění:** Duodopa SC se nedoporučuje k léčbě extrapyramidových účinků vyvolaných léky. Pacienti s těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, ledvinovým, jaterním nebo endokrinním onemocněním nebo s anamnézou vředové choroby nebo konvulzí mají být léčeni přípravkem Duodopa SC s opatrností. U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají zbytkové arytmie, má být pečlivě sledována srdeční činnost. U všech pacientů léčených přípravkem Duodopa SC má být pečlivě sledován rozvoj změn duševního stavu, deprese s tendencemi k sebevraždě a jiných závažných duševních změn. Pacienti s dřívější nebo současnou psychózou mají být léčeni s opatrností. Pacienti s chronickým glaukomem s otevřeným úhlem mají být léčeni přípravkem Duodopa SC s opatrností a pouze za předpokladu, že nitrooční tlak je dobře kontrolován. Duodopa SC může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Levodopa je spojována se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku. Při náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen komplex příznaků podobných neuroleptickému malignímu syndromu. Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. Dopaminový dysregulační syndrom je návyková porucha, která u některých pacientů léčených kombinací karbidopa/levodopa vede k nadměrnému užívání přípravku. Duodopa SC obsahuje hydrazin, který může být genotoxický a možná kancerogenní. Snížená schopnost zacházet se systémem pro podávání přípravku může způsobit komplikace. Takovým pacientům má asistovat pečovatel. Náhlé nebo postupné zhoršování bradykineze může být znamením obstrukce zařízení z jakýchkoli důvodů, a je třeba to vyšetřit. U pacientů léčených kombinací přípravky s obsahem levodopy s karbidopou byla hlášena polyneuropatie. Duodopa SC obsahuje 42,4 mg (přibližně 1,84 mmol) sodíku v jednom ml. **Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:** Studie interakcí nebyly s přípravkem Duodopa SC prováděny. U generických kombinací levodopy s karbidopou jsou interakce obecně známy. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Údaje o podávání přípravku Duodopa SC těhotným ženám nejsou k dispozici. Podávání v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci, se nedoporučuje. Levodopa je vylučována do lidského mateřského mléka. Kojení má být během léčby přípravkem Duodopa SC přerušeno. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Levodopa a karbidopa mohou vyvolat závratě a ortostatickou hypotenzi. Proto má být řízení a obsluha strojů vykonávána s opatrností. **Nežádoucí účinky:** *Velmi časté:* flegmóna, infekce, erytém, uzlík, edém, bolest a reakce v místě podání infuze, infekce močových cest, úzkost, deprese, halucinace, pády. *Časté:* absces v místě podání infuze, anemie, snížená chuť k jídlu, abnormální sny, agitovanost, stav zmatenosti, bludy, impulzivní porucha, insomnie, paranoia, psychotická porucha, spánkové ataky, porucha spánku, suicidální představa, kognitivní porucha, závrať, posturální závrať, dyskineze, dystonie, bolest hlavy, hypestezie, „on" a „off" fenomén, parestézie, polyneuropatie, somnolence, synkopa, tremor, nepravidelná srdeční frekvence, hypertenze, hypotenze, ortostatická hypotenze, dyspnoe, orofaryngeální bolest, břišní distenze, bolest břicha, zácpa, průjem, sucho v ústech, dysgeuzie, dyspepsie, dysfagie, flatulence, nauzea, zvracení, kontaktní dermatitida, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, svalové křeče, bolest šíje, inkontinence moči, retence moči, astenie, únava, malátnost, periferní edémy, bolest, následující reakce v místě podání infuze: modřina, exfoliace, extravazace, hematom, krvácení, indurace, zánět, podráždění, rezistence, papula, pruritus, vyrážka, otok, zvýšená hladina aminokyselin, zvýšená hladina homocysteinu v krvi, snížená hladina vitaminu B6, deficience vitaminu B12, snížení nebo zvýšení tělesné hmotnosti.

Použitelnost: Neotevřené: 20 měsíců. Přípravek musí být použit do 24 hodin po přenesení z injekční lahvičky do stříkačky. **Uchovávání:** Uchovávejte a převážejte v chladu (2 °C – 8 °C). Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byly chráněny před rozbitím. Mohou být uchovávány při pokojové teplotě do maximálně 30 °C po jedno období v délce až 28 dní. **Balení:** 7 injekčních lahviček po 10 ml. **Držitel rozhodnutí o registraci:** AbbVie s.r.o., Praha, Česká republika. **Registrační číslo:** 27/341/21-C. **Datum poslední revize SmPC:** 9. 11. 2023. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen smluvním zdravotnickým zařízením z veřejného zdravotního pojištění. *Seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku dříve, než jej předepíšete.*

Reference: 1. SmPC Duodopa SC [9. 11. 2023]

AbbVie s.r.o., Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5. Tel.: 233 098 111, www.abbvie.cz

03/2026
CZ-PRODD-260008

abbvie

XEOMIN®
Botulinum neurotoxin type A

Helping patients achieve their goals



JSEM EMMANUEL

MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je opět ovládat počítač pravou rukou.

Bez ohledu na etiologii

Pacient se spasticitou

Emmanuel, 44 let
Pacient se spasticitou

XEOMIN®
Botulinum neurotoxin type A

Helping patients achieve their goals



JSEM VICTORIA

MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je hledět rovně před sebe bez námahy.

Pacientka s cervikální dystónií

Victoria, 75 let
Pacientka s cervikální dystonií

XEOMIN®
Botulinum neurotoxin type A

Helping patients achieve their goals



JSEM HELMUT

MÁM SVŮJ CÍL

Mým cílem je opět povečeřet s přáteli.

1. a jediný botulotoxin A schválený v ČR k léčbě CHRONICKÉ SIALOREY

Pacient se sialoreou

Helmut, 79 let
Pacient se sialoreou

MERZ

Jaké jsou cíle vašich pacientů? Posuňme terapii botulotoxinem na vyšší úroveň.

DESITIN
SUCCESS IN CNS

Zkrácená informace o přípravku (nenahrazuje SPC)

Název přípravku: Xeomin 100 jednotek prášek pro injekční roztok. **Složení:** Jedna injekční lahvička obsahuje toxinum botulinicum (incobotulinum) typus A (150 kD), bez komplexotvorných proteinů 100 jednotek. **Indikace:** U dospělých symptomatická léčba blefarospasmu a hemifaciálního spasmu, cervikální dystonie převážně rotační formy (torticollis spastica), spasticity horních končetin a chronické sialorey v důsledku neurologických poruch. U dětí a dospívajících ve věku od 2 do 17 let s hmotnostní ≥ 12 kg k symptomatické léčbě chronické sialorey v důsledku neurologických poruch / poruch nervového vývoje. **Dávkování a způsob podání:** Jednotkové dávky nejsou pro přípravek Xeomin zaměnitelné s jinými přípravky obsahujícími botulotoxin typu A. Přípravek smí podávat pouze lékaři s vhodnou kvalifikací a potřebnou zkušeností s aplikací botulotoxinu. Optimální dávku, frekvenci a počet míst vpichu určí lékař pacientovi individuálně. Nesmí být překročeny jednorázové individuální dávky. Při léčbě dětí a dospívajících se má používat ultrazvuková kontrola. Dětem a dospívajícím může být před injekcí nabídnuta lokální anestezie, sedace nebo anestezie v kombinaci se sedací. Pro každou indikaci a skupinu pacientů (dospělí, dospívající a děti) je dávkovací schéma, postup a lokalizace specifická a individuální, pro informace k dávkování a dávkovacím schématům a způsobům podání je **nutné číst plnou verzi SPC**. Po rekonstituci je nutné použít XEOMIN pouze pro jedno sezení a pouze pro jednoho pacienta. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Generalizované poruchy svalové aktivity (např. myasthenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom). Infekce či zánět v navrhovaném místě aplikace. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Přípravek nesmí být podán do cévy. Před aplikací je nutné respektovat anatomická specifika pacienta. Opatrnost je nutná u pacientů s poruchou srážlivosti nebo léčených antikoagulancii. Upozornění se týká lokálních účinků a vzdáleného šíření toxinu, které mohou mít souvislost s nežádoucími účinky a mohou být život ohrožující. Byly hlášeny i případy úmrtí, které byly v některých případech spojeny s dysfagií, pneumonií. Další upozornění se týkají: výskytu značné tělesné slabosti; dysfagie; nutné opatrnosti u některých onemocnění jako AMLS, neuromuskulární dysfunkce, svalové atrofie; hypersenzitivních reakcí; tvorby protilátek. Pro úplné informace a upozornění k jednotlivým indikacím viz plná verze SPC. **Interakce:** Nebyly provedeny žádné interakční studie. Účinek botulotoxinu může být teoreticky potencován aminoglykosidovými antibiotiky nebo jinými léčivými přípravky zasahujícími do nervosvalového přenosu. Spektinomycin. Periferní myorelaxancia. Radioterapie hlavy, krku. Anticholinergika. 4-aminochinoliny. **Těhotenství a kojení:** Přípravek v těhotenství má být používán pouze pokud je nezbytně nutné a potenciální přínos převáží rizika a užití během kojení nemá být používán. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Mírný až středně silný vliv. Pacienti mají být poučeni. **Nežádoucí účinky:** Suché oči, rozostřené vidění, porucha vidění, sucho v ústech, bolest v místě injekce, infekce horních cest dýchacích, bolesti hlavy, presynkopa, závrať, dysfagie, nauzea, hyperhidróza, bolest v krku, svalová slabost, myalgie, svalová křeč, muskuloskeletální ztuhlost, astenie, parestezie. **Doba použitelnosti:** 4 roky, Rekonstituovaný roztok 24 hodin při teplotě 2 °C-8 °C **Uchovávání:** Při teplotě do 25 °C. **Balení a druh obalu:** Injekční lahvička (sklo třídy I) se zátkou (brombutylová pryž). **Velikost balení:** 1 injekční lahvička obsahující 100 jednotek. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt/Main, P.O. Box 11 13 53, 60048 Frankfurt/Main, Německo. **Registrační číslo:** 63/138/14-C. **Datum registrace/prodloužení registrace:** 23.7.2014/1.6.2016. **Datum poslední revize textu:** 18.12.2025. **Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, výši a podmínky úhrady naleznete v aktuálním Seznamu léčiv a PZLU hrazených ze zdravotního pojištění na www.sukl.cz. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s podrobnými informacemi v platném Souhrnu údajů o přípravku.** Zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Desitin Pharma, spol. s r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, telefon: +420 222 245 375, email: desitin@desitin.cz

Datum přípravy: květen 2026

XEO/ALL/16:9/05/26

LEVODOPA & DDCI + ONGENTYS®

SPOLEČNÁ LÉČBA PARKINSONOVY CHOROBY



Příznaky OFF se mohou objevit během prvních několika let po zahájení léčby levodopou a ovlivnit kvalitu života pacientů[1]

Když se u pacientů s Parkinsonovou chorobou začnou objevovat OFF symptomy před další dávkou levodopy/DDCI, optimalizujte léčbu pomocí přípravku Ongentys®[2,3]

- Plynulejší expozice levodopy[4]
- Zlepšuje čas ON/OFF[2,5]
- Obecně dobrá snášenlivost[2,6]
- Zlepšuje celkovou zátěž NMS[7–9]
- Jedna dávka denně[3]

ONgentys®
OPIKAPON

Zvýšení efektu levodopy

Bial MEDIS Therapeutics

1. Hauser RA, et al. 2021;183(7):721–727. 2. Ferreira JJ, Lee JY, et al. J Neurol. 2024 Oct;271(10):6728–6738. 3. Ongentys (opicapone) Souhrn údajů o přípravku. DS/2025-4. Ferreira JJ, et al. Mov Disord. 2022 Nov;37(11):2272–2283. 5. Ferreira JJ et al. Mov Disord 2020;35(Suppl 1):9447. Abstract 998. 6. Lees A, et al. Safety profile of Opicapone in the management of Parkinson's Disease. J Parkinsons Dis. 2019;9(4):733–740. 7. Reichmann H, et al. Transl Neurodegener. 2020;9(1):9. 8. Santos Garcia D, et al. Brain Sci. 2022;12(3):393. 9. Metta V, et al. J Neural Transm (Vienna). 2024 Jan;131(1):25–30.

[1] Výsledky získané z prospektivních studií v reálném světě, které hodnotily fluktuace NMS; DDCI, inhibitor DOPA-dekarboxylázy; NMS, nemotorické symptomy.

CZ-ONG-0923-001 Pouze pro zdravotnické pracovníky. Datum přípravy: září 2025

Zkrácené informace o léčivém přípravku

Název léčivého přípravku: Ongentys 25 mg tvrdé tobolky; Ongentys 50 mg tvrdé tobolky. **Složení**: Jedna tvrdá tobolka obsahuje opicaponum 25 mg (50 mg). **Terapeutické indikace**: Ongentys je indikován jako přídatná léčba k přípravkům obsahujícím kombinace levodopa/inhibitory DOPA-dekarboxylázy (DDCI) u dospělých pacientů s Parkinsonovou chorobou s motorickými fluktuacemi na konci dávkovacího intervalu („end-of-dose" fluktuace), které nelze těmito kombinacemi stabilizovat. **Dávkování a způsob podání:** Dávkování: Doporučená dávka je 50 mg denně přes paním nejméně jednu hodinu před nebo po kombinacích levodopy. Způsob podání: Perorální podání. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. SPC. Feochromocytom, paragangliom nebo jiné novotvary vylučující katecholaminy. Neuroleptický maligní syndrom a/nebo netraumatická rhabdomyolýza v anamnéze. Souběžné užívání s jinými inhibitory monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-B, např. fenelzin, tranylcypromin a moklobemid) než s těmi, které jsou určeny k léčbě Parkinsonovy choroby. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití**: Ongentys se vždy podává jako přídatná léčba k léčbě levodopou. Upozornění platná pro léčbu levodopou je tedy třeba brát v úvahu i při léčbě přípravkem Ongentys. Opikapon posiluje účinky levodopy. Pacienti a jejich ošetřovatelé by měli být upozorněni, že u pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo jinou dopaminergní léčbou, se mohou rozvinout symptomy impulzivních poruch včetně patologického hráčství, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého utrácení nebo nakupování, záchvatovitého a nutkavého přejídání. Ve studiích s nitrokatecholovými inhibitory katechol-O-methyltransferázy (COMT) byly hlášeny nárůsty hodnot jaterních enzymů. Ongentys obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat. **Interakce**: Použití s jinými IMAO je kontraindikováno. Další interakce viz SPC. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté: dyskineze. **Časté:** abnormální sny, halucinace, vizuální halucinace, insomnie, závrať, bolest hlavy, somnolence, ortostatická hypotenze, zácpa, sucho v ústech, nauzea, zvracení, svalové spasmy, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávejte v původním blistru/dobře uzavřené lahvičce k ochraně před vlhkostí. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Bial - Portela & Cª, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugalsko. **Registrační číslo(a)**: EU/1/15/1066/001-010. **Datum revize textu**: 05/2025. **Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Tento léčivý přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.**

Dříve než předepíšete tento přípravek, seznamte se s úplným souhrnem údajů o přípravku, který je k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu nebo na adrese držitele rozhodnutí o registraci.

ONgentys®
OPIKAPON

Zvýšení efektu levodopy

Bial MEDIS Therapeutics

Poznámky:

Poznámky:

Platinový partner

abbvie

Stříbrný partner

DESITIN
SUCCESS IN CNS

MEDIS

Vystavovatel

cardion

MagnaPharm

Medtronic

ORION PHARMA

STADA

Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce