

Program



47. ŠERCLOVY DNY A KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ MS CENTER

10. - 30. prosince 2020
Virtuální konference

Čtvrtek

10.12.2020

[illegible]

Čtvrtek

10.12.2020

📍 Online conference

07:00 - 08:00



SANOFI GENZYME SYMPOSIUM

📍 Online conference | Symposium

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI U PACIENTŮ LÉČENÝCH TERIFLUNOMIDEM - SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA SANOFI-AVENTIS

Horna M.

60 min

Čtvrtek

10.12.2020

📍 Online konference

08:00 - 10:00



SEKCE SESTER BLOK PŘEDNÁŠEK

📍 Online konference | Ústní sdělení

PÉČE O PACIENTA S CMP NA OUM

Dlouhá K.

10 min

KCC HRADEC KRÁLOVÉ – AKUTNÍ PÉČE O PACIENTA S CMP

Dlouhá K.

10 min

KCC HRADEC KRÁLOVÉ – NÁSLEDNÁ PÉČE O PACIENTA S CMP A CO DÁL?

Dlouhá K.

10 min

PÉČE O DĚTSKÉHO PACIENTA S CMP

Dlouhá K.

10 min

ROLE KLINICKÉHO LOGOPEDA U PACIENTŮ PO CMP

Dlouhá K.

10 min

IKTOVÉ CENTRUM PARDUBICE – PREZENTACE PRACOVISTĚ

Dlouhá K.

15 min

IKTOVÉ CENTRUM TRUTNOV – PREZENTACE PRACOVISTĚ

Dlouhá K.

10 min

IKTOVÉ CENTRUM NÁCHOD – PREZENTACE PRACOVISTĚ

Dlouhá K.

10 min

ASEPTICKÁ NEUROINFEKCE

Dlouhá K.

10 min

SPONTÁNNÍ NITROLEBNÍ HYPOTENZE

Dlouhá K.

10 min

Čtvrtek

10.12.2020

📍 Online konference

10:30 - 12:30



DĚTSKÁ NEUROLOGIE, SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ, VARIA

📍 Online konference | Ústní sdělení

NOVINKY U NEUROMUSKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V DĚTSKÉM VĚKU

Dlouhá K.

30 min

IDIOPATICKÉ ZÁNĚTLIVÉ MYOPATIE Z POHLEDU REVMATOLOGA

Dlouhá K.

30 min

VARIABILITA DYSTONIE U DĚTÍ: KLASIFIKACE A KAZUISTIKY

Dlouhá K.

30 min

NÁHLE VZNIKLÁ EXCESIVNÍ SPAVOST JAKO SUSPEKTNÍ KONVERZNÍ PORUCHA

Dlouhá K.

10 min

KOMPLIKACE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY U 17LETÉ DÍVKY

Dlouhá K.

10 min

Čtvrtek

10.12.2020

📍 Online konference

13:30 - 14:00



RS BLOK

📍 Online konference | Ústní sdělení

RS A TĚHOTENSTVÍ

Dlouhá K.

20 min

DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA SEKUNDÁRNĚ PROGRESIVNÍ RS ANEB VÝZNAM ROZPOZNANÍ ČASNÝCH ZNÁMEK PROGRESE V KLINICKÉ PRAXI? - PŘEDNÁŠKA SPONZOROVANÁ SPOLEČNOSTÍ NOVARTIS

Dlouhá K.

10 min

JEDNÁ SE O RS

Horna M.

10 min

ADHERENCE K LÉČBĚ U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

Horna M.

15 min

Čtvrtek

10.12.2020

📍 Online konference

14:00 - 16:00



VŠEOBECNÁ NEUROLOGIE, VARIA

📍 Online konference | Ústní sdělení

KLINICKÉ A TERAPEUTICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI

Dlouhá K.

10 min

PŘEHLED LÉČBY BOTULOTOXINEM V CENTRU PRO LÉČBU SPASTICITY A DYSTONIÍ VE FNHK

Dlouhá K.

10 min

ANTIAGOAGULAČNÍ TERAPIE WARFARINEM VE FN V ROCE 2020

Dlouhá K.

20 min

LARYNGEÁLNÍ EMG A LÉČBA SPAZMODICKÝCH DYSFONIÍ

Dlouhá K.

10 min

MIGRÉNA A BIOMÁRKERY

Dlouhá K.

10 min

LÉČBA PORUCH CHOVÁNÍ U DEMENCÍ

Dlouhá K.

20 min

VÝZNAM GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ V DIAGNOSTICE VZÁCNÝCH PRIONOVÝCH ONEMOCNĚNÍ CNS. KAZUISTIKA

Dlouhá K.

10 min

Čtvrtek

10.12.2020

📍 Online konference

16:30 - 18:00



NCH, VASKULÁRNÍ PROBLEMATIKA

📍 Online konference | Ústní sdělení

FUNGOVALA ČESKÁ NEUROCHIRURGIE BĚHEM NEJHORŠÍHO MĚSÍCE COVID?

Dlouhá K.

20 min

CHIRURGICKÁ LÉČKA MOZEČKOVÝCH ISCHEMIÍ

Dlouhá K.

20 min

KOREKCE PROGRESIVNÍ DYSTROFICKÉ CERVIKÁLNÍ KYFÓZY PŘI NEUROFIBROMATÓZE TYPU 1

Dlouhá K.

10 min

TRANSSYLVIOVSKÁ AWAKE RESEKCE INZULÁRNÍHO GLIOMU

Dlouhá K.

10 min

COVID-19 A IKTUS

Dlouhá K.

10 min

PROTIDESTIČKOVÁ A ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA V NEUROLOGICKÉ PRAXI

Dlouhá K.

10 min

ANALÝZA VLASTNÍHO SOUBORU MT 2013-2020

Dlouhá K.

10 min

SPONTÁNNÍ INTRADURÁLNÍ EXTRAMEDULÁRNÍ KRVÁCENÍ U ANTIKOAGULOVANÉ PACIENTKY

Dlouhá K.

10 min

ANALÝZA PŘÍČIN ZPOŽDĚNÍ CEA U SYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ

Dlouhá K.

10 min

Čtvrtek

10.12.2020

📍 Online konference

18:00 - 19:30



MS MASTERS FORUM WEBINAR OF 2020 (MERCK - SATELITNÍ SYMPÓZIUM)

📍 Online konference | Symposium

Registraci na webinář naleznete [ZDE](#).

Roche

Roztroušená skleróza
je progresivní onemocnění⁶⁻⁸

Kdy je potřeba zahájit léčbu
vysoce účinnou terapií?

NOVĚ
možnost
2 hodinová infuze
1x za 6 měsíců^{*1}

NEJDŘÍVE²⁻⁵

* Navyskytly se
u řádně z předchozích
infuzí reakce související
s infuzí (IRR) stupně 3
a závažnější, lze následně dávky
podat kratší (2hod) infuzí.

▼ **Zkrácená informace o přípravku**
Ocrevus 300 mg – koncentrát pro infuzní roztok

Účinná látka: ocrelizumabum. **Indikace:** Přípravek

Ocrevus je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícími

formami roztroušené sklerózy (RRS) s aktivním onemocněním

definovaným klinicky nebo pomocí zobrazovacích metod. Přípravek Ocrevus

je indikován k léčbě dospělých pacientů s časnou primárně progresivní roztroušenou

sklerózou (PPRS), s ohledem na délku trvání onemocnění, stupeň disability a zobrazovacími

metodami prokázanou zánětlivou aktivitu. **Dávkování:** Úvodní dávka 600 mg přípravku Ocrevus se podává

jako dvě samostatné intravenózní infuze; první jako 300 mg infuze, následovaná po dvou týdnech druhou 300 mg infuzí.

Následné dávky přípravku Ocrevus se poté podávají v podobě jednorázové 600 mg intravenózní infuze jednou za 6 měsíců.

Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, současná aktivní infekce, pacienti v závažném imunokompromitovaném stavu, známé

aktivní maligní onemocnění. **Upozornění:** Reakce související s infuzí (IRR): u ocrelizumabu se vyskytl IRR. Příznaky mohou nastat v průběhu jakékoli infuze, ale byly častěji hlášeny během první infuze

a v průběhu 24 hodin od podání infuze (pruritus, vyrážka, urtika, erytém, infuze hrdla, bolest orofaryngu, dyspnoe, faryngeální nebo laryngeální edém, zrudnutí, hypotenze, horečka, únava, bolest hlavy,

závrť, nauzea a tachykardie). Hypersenzitivní reakce: se mohou projevit v průběhu jakékoli infuze, ale typicky se neprojevují v průběhu první infuze. U následných infuzí mají závažnější příznaky, než

kteřé nastaly dříve, nebo nové závažné příznaky, což má vést k úvahám o možné hypersenzitivní reakci. Pacienti se známou IgE zprostředkovanou hypersenzitivitou na ocrelizumab nesmějí být tímto

přípravkem léčeni. Infekce: Podání přípravku Ocrevus musí být u pacientů s aktivní infekcí odloženo, dokud infekce neodezní. Těžce imunokompromitovaní pacienti (např. s lymfopenií, neutropenií,

hypogamaglobulinemií) by neměli být tímto přípravkem léčeni. **Lékové interakce:** se nepředpokládají, protože ocrelizumab se z oběhu odstraňuje katabolismem. **Těhotenství a kojení:** Ženy ve fertilním věku

musí v průběhu doby, kdy dostávají přípravek Ocrevus a po dobu 12 měsíců po poslední infuzi přípravku Ocrevus používat antikoncepci. Přípravek Ocrevus je humanizovaná monoklonální protilátka

G1 podtypu imunoglobulinu a o imunoglobulinech je známo, že prostupují placentární bariérou. Je třeba se vyvarovat podávání přípravku Ocrevus v těhotenství, pokud potenciální prospěch pro

matku nepřeváží nad potenciálními riziky pro plod. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly IRR a infekce. **Podmínky uchování:** Uchovávejte v chladničce

(2 °C–8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičky v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Balení přípravku:** 10 ml koncentráte ve skleněné injekční lahvičce. **Držitel**

registračního rozhodnutí: Roche Registration GmbH, Grenzach-Wyhlen, Německo. **Registrační číslo:** EU/117/1231/001; EU/117/1231/002. **Datum první registrace:** 3. 1. 2018. **Poslední**

revize textu: 30. 4. 2020. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznámte s úplným

známým Souhrnem údajů o přípravku Ocrevus. Podrobné informace k dispozici na www.ema.europa.eu.

* Všímejte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz/nahlasit-nezadouc-ucinek.

Reference: 1. SPC OCREVUS (ocrelizumab), datum poslední revize textu: 30. 4. 2020. 2. Hauser S et al. N Engl J Med. 2017;376(3):221-

234. 3. Hauser S et al. (Supplementary appendix). N Engl J Med. 2016. http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1601277/suppl./file/nejm1601277_appendix.pdf. 4. Leroy E, Taucant J, Le Page E, et al. Brain. 2010;133(Pt 7):1900-13.

5. KRAUS10021 – Klinický doporučený postup pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica

a onemocnění jejího širšího spektra, verze 2.0. 6. Rashid W, Davies GR, Chard DT, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry.

2006;77(1):51-55. 7. Kantarci OH, Lebrun C, Siva A, et al. Ann Neurol.

2016;79(2):288-294. 8. Brownlee WJ, Altmann DR, Alves Da Mota

P, et al. Mult Scler. 2017;23(5):665-674.

ROCHE s.r.o.

Futurama Business Park Bld F, Sokolovská 685/136f

168 00 Praha 6, tel.: +420 220 382 111

e-mail: prague.info@roche.com, www.roche.cz



M-C200000262

Diamantový partner

MERCK

sanofi

Zlatý partner



Stříbrný partner



Bronzový partner



Vystavovatelé



Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce