Program

19. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ 2022

18.-19. února 2022

Hotel Port, Doksy

Pořadatel

MH Consulting s.r.o. ve spolupráci s SSLB ČLS JEP.

Prezident kongresu

MUDr. Dana Vondráčková

Organizátor

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Praha 10

Partneři a vystavovatelé

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. 2	G.L. Pharma Czechia s.r.o. 6	NeuraxPharm Bohemia s.r.o. 11



Detailní program k dispozici pouze online

QR kód na Vaší jmenovce

Program, objednané služby a instrukce naleznete po nascenování QR kódu na Vaší jmenovce.

Webové stránky akce

Oficální stránky akce na www.mhconsulting.cz.

QR kód níže

Program naleznete po nascenování QR kódu níže:

Pátek

18. 02. 2022

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Hlavní sál									Blok I 14:00 - 15:55	Přestávka na kávu 15:55 - 16:30		Blok II 16:20 - 18:30			Večeře 19:00 - 22:00			
Foyer								Registrace účastníků a firem 13:00 - 16:00										

Ústní sdělení | Coffee Break | Registrace firem a účastníků | Večeře

Sobota

19. 02. 2022

	06:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Hlavní sál				Blok III 09:30 - 10:50		Přestávka .. 10:50 - 11:10	Blok IV 11:10 - 12:00	Oběd 12:00 - 13:00										

Ústní sdělení | **Coffee Break** | **Oběd**

Pátek

18. 02. 2022

Hlavní sál | Foyer

14:00-15:55

BLOK I
Hlavní sál | Ústní sdělení

ZAHÁJENÍ — 10 min
Vondráčková D.

TAJEMNÝ PROPLETENEC DUŠE A TĚLA — 30 min
Anders M.

APLIKACE ALGEZIOLOGIE V PALIATIVNÍ PÉČI, V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ — 10 min
M. Voldřich

FENROO - KLINICKÉ ZKUŠENOSTI — 15 min
Fricová J.

AKTUÁLNÍ POHLED NA NEUROPATICKOU BOLEST — 30 min
Kozák J.

OPIOIDY (NE) BEZPEČNÁ LÉČBA BOLESTI — 20 min
Popperová N.

15:55-16:30

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Hlavní sál | Coffee Break

Pátek

18. 02. 2022

Hlavní sál | Foyer

16:20-18:30

BLOK II
Hlavní sál | Ústní sdělení

AKTUALITY NE-ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI - AKTUALITY — 30 min
Popov P.

SKUDEXA - NOVINKY V LÉČBĚ AKUTNÍ BOLESTI. — 20 min
Slíva J.

CETALGEN A JINÉ NOVINKY V LÉČBĚ BOLESTI — 20 min
Slíva J.

INTERVENČNÍ TECHNIKY V ALGEZIOLOGICKÉ PRAXI — 20 min
Lejčko J.

LÉČBA BOLESTI ZA COVIDU — 20 min
Trnka J.

DISKUZE — 15 min
.

ZÁVĚR
.

19:00-22:00

VEČEŘE
Hlavní sál | Večeře

Pátek

18. 02. 2022

Hlavní sál | Foyer

13:00-16:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM
Foyer | Registrace firem a účastníků

Sobota

19. 02. 2022

Hlavní sál | Foyer

09:30-10:50

BLOK III
Hlavní sál | Ústní sdělení

KONOPÍ A INTERAKCE. KONOPÍ A COVID — 40 min
Suchopár J.

SPECIÁLNÍ KOMPLIKACE PŘI DLOUHODOBÉ APLIKACI MORFINU DO SUBARACHNOIDÁLNÍHO PROSTORU PUMPOVÝM SYSTÉMEM — 20 min
Vrba I.

SYNDROM NITROLEBNÍ HYPOTENZE-KASUISTIKA — 20 min
Kulda K.

10:50-11:10

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Hlavní sál | Coffee Break

Sobota

19. 02. 2022

Hlavní sál | Foyer

11:10-12:00

BLOK IV
Hlavní sál | Ústní sdělení

BOLESTI HLAVY - 2 KASUISTIKY — 20 min
Hrubešová J.

MOZKOVÁ STIMULACE STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM — 20 min
Fricová J.

NOVINKY VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU. POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, IPVZ — 10 min
Vondráčková D.

DALŠÍ SETKÁNÍ
.

ZÁVĚR
.

12:00-13:00

OBĚD
Hlavní sál | Oběd

SKUDEXA® 75 mg/25 mg

tramadol hydrochlorid + dexketoprofen trometamol

K léčbě středně silné až silné akutní bolesti[1,2]

Multimodální, účinná analgezie a rychlá úleva od akutní bolesti v jedné tabletě[1–6]

První fixní kombinace tramadolu a dexketoprofenu[1,2,7]

Centrální a periferní analgezie[1,2,5]

Protizánětlivé působení[1,2]

▼ Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakékoli podezření na nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Zkrácená informace o přípravcích Skudexa 75 mg/25 mg potahované tablety. Skudexa 75 mg/25 mg granule pro perorální roztok v sáčku. **Složení:** Tramadol hydrochlorid 75 mg a dexketoprofen 25 mg v 1 tabletě/sáčku. **Terapeutické indikace:** Symptomatická krátkodobá léčba středně silné až silné akutní bolesti u dospělých pacientů. **Dávkování** a způsob podání: 1 tableta/sáček, další dávky v minimálním odstupu 8 hodin, maximálně 3 tablety/sáčky denně u starších pacientů, pacientů s lehkou až střední těžkou poruchou funkce jater nebo s lehkou poruchou funkce ledvin 2 tablety/sáčky denně. Léčba nemá být delší než 5 dní. Pro rychlý účinek užívat alespoň 30 minut před jídlem. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na složky přípravku. Anamnéza těžké astmy po užití NSAI, astmatický záchvat, bronchospasmus, akutní rýma, tvorba nosních polypů, kopřivka, angioneurotický edém. Anamnéza fotodermatózy nebo fotokožní reakce při užívání ketoprofenu nebo fibrátu. Aktivní peptická vředová onemocnění, GI krvácení, vředová nebo perforace v anamnéze. Chronická dyspepsie. Jiné aktivní krvácení nebo porucha krvácivosti. Cerebrovaskulární nebo jiná krvácivá cévní mozková příhoda. Závažné srdeční selhání. Středně těžká až těžká porucha funkce ledvin. Těžká porucha funkce jater. Hemoragická diátéza a jiná porucha srážlivosti. Závažná dehydratace. Akutní intoxikace alkoholem, hypnotiky, analgetiky, opioidy nebo psychotropními léky. Užívání inhibitorů MAO v současnosti nebo během posledních 14 dní. Epilepsie nedostatečně kontrolovaná léčbou. Těžká duševní onemocnění. Tilmanovi u kojení. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Přípravek nelze vysoké senzitivitě a závisí u dvorčí tak nelze hrdlo a obsahy stejně. Pokud se u pacienta objeví gastrointestinální krvácení nebo ulcerace, léčba má být ukončena. Užívání se nedoporučuje pacientům, kteří užívají léky ovlivňující hemostázu. Při prvních známkách výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersenzitivity přípravek ihned vysadit. Při onemocnění varicellou se doporučuje vyhnout se užívání dexketoprofenu. Pacientům citlivým na opioidy podávat s opatrností. Současné užívání přípravku Skudexa s sedativy, jako jsou benzodiazepiny nebo jim podobné látky, může vést k sedaci, respirační depresi, kómatu a smrti. **Interakce:** Nevhodné kombinace: jiné NSA, antikoagulanta, hepariny, kortikoidy, fibráty, antidepresiva ve vysokých dávkách, hypnotiky a sulfonamidy, inhibitory MAO, snížení epileptického prahu. Další informace viz plné znění Souhrnu údajů o přípravku. **Nežádoucí účinky:** Časté: závratě, nevolnost, zvracení. Méně časté a MU hlášení pro podrobné sdělení přípravku viz plné znění Souhrnu údajů o přípravku. **Uchovávání:** V původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Balení:** 15 potahovaných tablet resp. 15 sáčků. **Držitel registrace:** Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg, Lucembursko. **Registrační čísla:** Tablety 65/005/15-C, sáčky 65/192/17-C **Poslední revize textu:** 23. 12. 2021. Přípravky jsou vydávány pouze na lékařský předpis a jsou dostupné hlavně z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku, kde najdete úplný seznam nežádoucích účinků, kontraindikací a opatření pro použití. Odkaz na plné znění Souhrnu údajů o přípravku Skudexa 75 mg/25 mg potahované tablety: http://www.sukl.cz/modules/medicalinformation.php?code=617321&lab=tablety, Skudexa 75 mg/25 mg granule pro perorální roztok v sáčku https://www.sukl.cz/modules/medicalinformation.php?code=617315&lab=sacky

1. Souhrn údajů o přípravku SKUDEXA® 75 mg/25 mg potahované tablety, datum poslední revize textu dne 23. 12. 2021. 2. Souhrn údajů o přípravku SKUDEXA® 75 mg/25 mg granule pro perorální roztok, datum poslední revize textu dne 23. 12. 2021. 3. McGuay HJ, Moore RA, Barkin A, Gialnutsinova O, Polkedi B, Parmanchos H, et al. Br J Anaesth. 2015 Feb; 114(2):269-76. 4. Moore RA, Gray-Escobar C, Figueiredo R, Tóth-Bogi Z, Dreitlein T, Willert S, et al. J Headache Pain. 2015; 16:60. 5. Moore RA, McGuay HJ, Tarnasiewicz J, Robbo G, Tuhunau G, Lietuvietis N, et al. BMC Anesthesiol. 2016 Jan 22; 16:9. 6. Gray-Escobar C, Molina M, Moreno A, Dreitlein T, Willert S, Gierglera E, et al. BMJ Open. 2019 Feb 19;9(2):e022737. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022715. 7. Dostálová MKO, rozhlasové dne 18. února 2020, <http://www.sukl.cz/modules/medicalinformation/search.php>

Určeno pouze odborníkům ve smyslu zákona 40/1995 Sb. Materiál schválen: únor 2022. **Materiál platný do:** únor 2024.

BERLIN-CHEMIE MENARINI

Berlin-Chemie/A.Menarini Česká republika s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, **tel.:** 267 199 333, **fax:** 267 199 336, **e-mail:** office@berlin-chemie.cz

02-999-01-2022-v01-plné-digital

Poznámky:

Poznámky:

Platinový partner

STADA

Zlatý partner

BERLIN-CHEMIE MENARINI

mundi pharma

Vystavovatel

bonum finem

GL Pharma

Glenmark
A new way for a new world

KRKA

NEURAXPHARM

Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce